

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

1. **El virus de la gripe es:**
A) Virus ADN envuelto con estructura compleja y multiplicación citoplasmática.
B) Virus ARN desnudo con estructura icosaédrica y multiplicación citoplasmática.
C) Virus ARN envuelto con estructura helicoidal y multiplicación nuclear.
D) Virus ADN desnudo con estructura icosaédrica y multiplicación nuclear.
2. **El primer marcador virológico detectable en el suero de un paciente con hepatitis aguda B es:**
A) HBsAg.
B) HBcAg.
C) HBeAg.
D) anti-HBc IgM.
3. **La reacción de Paul-Bunnell es positiva en la:**
A) Leucemia mieloide crónica.
B) Mononucleosis infecciosa.
C) Anemia hemolítica enzimopática.
D) Anemia ferropénica.
4. **Los picornavirus producen:**
A) Cáncer.
B) Polio.
C) Sarampión.
D) Varicela.
5. **Cuando un virus se transmite de la madre al feto durante el embarazo, se habla de:**
A) Transmisión vertical.
B) Transmisión horizontal.
C) Transmisión oblicua.
D) Todas son falsas.
6. **La mononucleosis infecciosa está producida por:**
A) Citomegalovirus.
B) Epstein-Barr.
C) Togavirus.
D) Ninguna es correcta.
7. **Se pueden identificar, interpretar y determinar los resultados de un cultivo celular de virus en tubo de una de estas formas:**
A) Por aglutinación.
B) Por sedimentación.
C) Por efecto citopático.
D) Por efecto antibiótico.
8. **La familia herpesviridae está compuesta por una serie de virus de gran importancia, los principales son:**
A) Herpes simple, Varicela-Zoster, Citomegalovirus y Epstein-Barr.
B) Herpes simple, Varicela-Zoster, Citomegalovirus y Parotiditis.
C) Herpes simple, Varicela-Zoster, Parvovirus y Epstein-Barr.
D) Herpes simple, Varicela-Zoster, Adenovirus y Parotiditis.
9. **El virus de la hepatitis d (VHD), es un virus incompleto que requiere.....**
A) VHC para su replicación.
B) VHA para su replicación.
C) VHB para su replicación.
D) Todas son válidas.
10. **En una persona vacunada de la hepatitis b, ¿qué marcador frente al virus debe detectarse?**
A) HbsAg
B) HbcAc
C) HbsAc
D) HbeAg
11. **En la preparación de medios de cultivo para virus, ¿qué se añadirá antes de utilizarlo?**
A) Indicadores, iones y factores de crecimiento.
B) L-Glutamina, antibióticos y suero bovino fetal
C) MEM, PBS y FICOLL.
D) VERO y unas gotas de MRC-5.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

12. En relación a las infecciones por virus respiratorios indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- A) Los rinovirus son la causa más frecuente de catarro común en los adultos.
- B) El virus parainfluenza tipo 1 es el agente responsable del mayor número de casos de laringo-traqueobronquitis aguda.
- C) Los virus parainfluenza suelen aparecer de forma epidémica, habitualmente en verano**
- D) Los brotes de gripe, se suelen producir en invierno y al comienzo de la primavera.

13. ¿Cuál de las siguientes características describe mejor al Papilomavirus Humano?

- A) Un virus envuelto, con ADN lineal bicatenario.
- B) Un virus desnudo, con ADN circular bicatenario.**
- C) Un virus envuelto, con ARN monocatenario (de sentido negativo).
- D) Un virus desnudo, con ADN lineal bicatenario.

14. La roséola o exantema súbito es producido por el virus

- A) Herpes tipo 8
- B) Parvovirus B19
- C) De la rubéola
- D) Herpes tipo 6**

15. Ante la sospecha de encefalitis por Herpes simple 1 (VHS-1) ¿qué método diagnóstico considera de elección?:

- A) Cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR).
- B) PCR de LCR.**
- C) Detección de anticuerpos de la clase IgM en suero.
- D) Antigenemia cuantitativa.

16. Un brote diarreico en una residencia de ancianos en el cual los cultivos bacterianos son negativos hace sospechar como causa principal

- A) Rotavirus
- B) Adenovirus

C) Norovirus

D) Astrovirus

17. Los virus de interés en patología humana se clasifican en la actualidad por las siguientes características

- A) Tipo, estructura y estrategia de replicación del ácido nucleico.
- B) Simetría de la cápside.
- C) Presencia o ausencia de envoltura.
- D) Todas las respuestas anteriores son ciertas.**

18. La causa más frecuente de gastroenteritis aguda nosocomial en la infancia en países del primer mundo es:

- A) Astrovirus
- B) Adenovirus
- C) Rotavirus**
- D) Calicivirus

19. Señale la respuesta correcta en relación al diagnóstico mediante Métodos moleculares de la enfermedad por Citomegalovirus:

- A) Las técnicas moleculares, especialmente las de amplificación, se han aplicado profusamente al diagnóstico del CMV.
- B) La principal ventaja de estos métodos es su gran sensibilidad.
- C) La especificidad es superior al 98%.
- D) Todas son ciertas.**

20. Las glucoproteínas de codificación viral.

- A) Se hallan presentes en los virus con envoltura.
- B) Participan en la fijación del virión a la superficie de la célula diana.
- C) Son expresadas en la superficie de la célula infectada durante el ciclo de replicación del virus.
- D) Todas las afirmaciones son ciertas.**

21. La prueba rápida para la mononucleosis infecciosa detecta en sangre total un tipo de proteínas sanguíneas conocidas como Anticuerpos



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

Heterófilos, producidos por el sistema inmune en respuesta a la infección por:

- A) Parvovirus B 9.
- B) Virus de Epstein - Barr.**
- C) Adenovirus.
- D) Parainfluenza virus

22. Según su género, ¿en qué grupo clasificarías el virus del Ébola?

- A) Pneumo- virus.
- B) Entero - virus.
- C) Filo - virus.**
- D) Flavi - virus.

23. ¿Qué glicoproteína presenta en su cubierta el virus de Influenza (Gripe)?:

- A) Neuraminidasa.
- B) Polimerasa.
- C) Hemaglutinina.
- D) A y C son correctas.**

24. ¿Qué microscopio utilizaríamos para visualizar un virus?

- A) Microscopio óptico.
- B) Microscopio de contraste de fases.
- C) Microscopio de campo oscuro.
- D) Microscopio electrónico.**

25. En un paciente VIH positivo, ¿qué marcadores de linfocitos T deberíamos tener en cuenta?

- A) CD4 y CD8**
- B) CD5 y CD3
- C) CD20
- D) CD69 y CD25

26. El virus de la rubéola pertenece a la familia de los:

- A) Rhabdovirus.
- B) Togavirus.**
- C) Ortomixovirus.
- D) Paramixovirus.

27. La secuencia de la replicación en un virus es:

- A) Penetración – Adhesión – Replicación – Liberación – Recombinación.
- B) Adhesión – Penetración – Replicación – Recombinación – Liberación.**
- C) Replicación – Adhesión – Recombinación – Liberación – Penetración.
- D) Penetración – Liberación – Adhesión – Recombinación – Replicación.

28. La simetría estructural de la cápside del virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es:

- A) Icosaédrica.**
- B) Cilíndrica.
- C) Helicoidal.
- D) Esférica.

29. Los métodos serológicos para la detección de virus se basan en:

- A) Detectar el genoma viral mediante sondas genéticas marcadas.
- B) Detectar la presencia de anticuerpos específicos en el suero del paciente.**
- C) Utilización de colorantes como la hematoxilina para detección de cuerpos de inclusión.
- D) Inoculación de la muestra en cultivos celulares.

30. En los virus, el soporte de la información genética de la capacidad de replicación y de su potencial infeccioso reside en:

- A) El ácido nucleico.**
- B) La cápside.
- C) Las enzimas.
- D) La envoltura.

31. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad que puede ser causada por:

- A) Virus de Epstein-Barr.**
- B) Papilomavirus humano.
- C) Rotavirus.
- D) Giardia lamblia.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

32. ¿Cuál es el virus causante de la mononucleosis infecciosa?

- A) Citomegalovirus.
- B) Varicela Zoster.
- C) Epstein-Barr.**
- D) Rinovirus.

33. ¿Qué técnica de confirmación no se puede emplear para el diagnóstico del SIDA?

- A) Inmunoelectrotransferencia o Western Blot.
- B) Inmunofluorescencia indirecta.
- C) Radioinmunoprecipitación.
- D) Tiras reactivas de Ag.**

34. ¿Cuáles de las siguientes condiciones son necesarias para la toma y transporte de muestras para el estudio de virus?

- A) La sangre total no se debe congelar.
- B) La muestra debe mantenerse refrigerada desde el momento de su obtención.
- C) La temperatura influye en la viabilidad de los virus durante el transporte.
- D) Todas son correctas.**

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- A) El virus de la hepatitis D (VHD) sólo se encuentra en personas portadoras del virus de la hepatitis B.
- B) Las medidas de control de la transmisión son las mismas que para la hepatitis B.
- C) No existe infección crónica por VHD.**
- D) No existe una vacuna que evite la sobreinfección por hepatitis D en personas con infección crónica por VHB.

36. Las pruebas de la confirmación del HIV se realizan:

- A) Con un screening con un ELISA (enzimoinmunoensayo).
- B) Detectando el antígeno p24 en sangre.
- C) Con un Western Blot.**
- D) Detectando ADN proviral.

37. No es un herpesvirus:

A) Virus de la Varicela - Zóster.

B) Virus de la Parotiditis.

C) Citomegalovirus.

D) Virus de Epstein – Barr.

38. Los microorganismos de pequeño tamaño que no poseen actividad metabólica fuera de las células susceptibles, es decir, que necesitan servirse de organismos vivos para poder vivir son:

A) Bacterias.

B) Virus.

C) Hongos.

D) Protozoos.

39. ¿Cómo se denomina el proceso por el que el ADN libre se inserta en una célula receptora competente?

A) Conjugación.

B) Transformación.

C) Transducción

D) Recombinación

40. ¿Qué es un micelio?:

A) El conjunto de varias levaduras.

B) Un sinónimo de espora.

C) Un tipo de hongos.

D) El conjunto de hifas con sus ramificaciones.

41. ¿Qué tipo de microorganismo es *Cryptococcus neoformans*?:

A) Una levadura.

B) Una espiroqueta.

C) Un coco.

D) Un bacilo.

42. Para la identificación de *Candida albicans*, se utiliza

A) Prueba de oxidasa.

B) Test de Graham.

C) La gota gruesa.

D) Prueba de la filamentación.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

43. La criptococosis es una enfermedad humana causada por el *Cryptococcus neoformans* y se adquiere por:
- A) Inhalación de esporas.
- B) Ingestión de alimentos contaminados.
- C) Picadura de insectos.
- D) Contacto directo de la piel de los animales.
44. Con relación al examen directo de muestras para la detección de hongos patógenos. Señale la respuesta FALSA:
- A) Raspados, curetajes y pelos pueden observarse directamente suspendida la muestra en solución salina.
- B) Las cápsulas polisacáridas de *Cryptococcus neoformans* se ven como una tinción negativa de las partículas con tinta china.
- C) La tinción de Gram es útil para ver levaduras que se tiñen de Gram negativas.
- D) La tinción de Giemsa o Wright es útil si se sospecha histoplasmosis, pues se aprecian las células de las levaduras en el interior de los macrófagos.
45. Los dermatofitos más frecuentemente aislados en el ser humano se agrupan en los géneros, señalar el falso:
- A) *Microsporum*
- B) *Candida*
- C) *Epidermophyton*
- D) *Trichophyton*
46. ¿Para qué realizarías un zimograma?
- A) Estudio de características morfológicas de crecimiento de los hongos.
- B) Estudio de la fermentación de azúcares para identificación de hongos.
- C) Pruebas de sensibilidad de los hongos antifúngicos.
- D) Estudio de las formas de reproducción de los hongos.
47. ¿Para qué se utiliza la cicloheximida en el agar Sabouraud?
- A) Para evitar el crecimiento de bacterias contaminantes.
- B) Para evitar el crecimiento de hongos contaminantes.
- C) Para la nutrición del hongo a estudiar.
- D) Ninguna de las anteriores es correcta.
48. Señale cuál de los siguientes cultivos se utiliza para la siembra de hongos:
- A) Mac Conkey.
- B) Sabouraud.
- C) Cleb.
- D) Agar chocolate.
49. De las siguientes patologías producidas por hongos, ¿cuál se desarrolla preferentemente en los pulmones?:
- A) Micetoma.
- B) Cromoblastomycosis.
- C) Tiña negra palmar.
- D) Aspergilosis.
50. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos es de origen micótico?:
- A) *Cryptococcus*.
- B) *Taenia saginata*
- C) *Entamoeba histolytica*.
- D) *Haemophilus*.
51. Cuando observamos una microconidia al microscopio, ¿a qué microorganismos se hace referencia?
- A) Virus.
- B) Hongos.
- C) Bacterias.
- D) Parásitos.
52. ¿Qué agente etiológico produce la tiña versicolor o la pitiriasis versicolor?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

- A) Micetoma.
B) Malassezia furfur.
 C) Exopholia werneckii.
 D) C. neoformans.
53. ¿Qué tipo de muestra es la más adecuada, para el diagnóstico de laboratorio de *P. carinii*?
 A) Esputo.
B) Exudado bronquial obtenido por lavado bronquial.
 C) Sangre.
 D) Orina.
54. No es una bacteria patógena del tracto genital:
 A) *N. gonorrhoeae*.
B) Candida albicans.
 C) *C. trachomatis*.
 D) *Gardnerella vaginalis*.
55. Los hongos pueden ser:
 A) Unicelulares.
 B) Pluricelulares.
 C) Dimórficos.
D) Todas son correctas.
56. ¿Cuál de los siguientes parámetros biológicos es un marcador inmunológico específico con interés pronóstico en la infección por VIH-1, presentando una mayor eficacia en la progresión de la infección y que, además, indica el momento adecuado de iniciar la terapia antiviral?:
A) Linfocitos CD4.
 B) β 2- microglobulina.
 C) Neopterina.
 D) IgA.
57. ¿Cuál de los siguientes marcadores séricos del virus de la hepatitis B aparece después de la administración de la vacuna o gamma globulinas específicas?
 A) HBsAg
B) Anti-HBs
- C) Anti-HBc
 D) Anti-HBe.
58. Señale la respuesta correcta en relación al virus de la hepatitis delta:
 A) Es un virus completo que se asocia al virus de la hepatitis B y provoca cuadros de hepatitis fulminante.
 B) Es un virus defectuoso que sólo puede infectar a los hepatocitos cuando esté presente el VHC.
C) Es un virus defectuoso que se asocia al virus de la hepatitis B (confección) en cuadros de hepatitis aguda fulminante.
 D) En nuestro medio la infección por VHD NO está presente en usuarios de drogas por vía parenteral.
59. Señale la respuesta FALSA en cuanto a las condiciones de incubación:
 A) La mayoría de los cultivos bacterianos se incuban a 35-37°C.
B) La mayoría de los cultivos de hongos lo hacen a 25°C.
 C) Para *Campylobacter*, la atmósfera microaerófila tiene la siguiente composición: 5% de O₂, 10% de CO₂, 85% de N₂.
 D) Para aislar *Campylobacter* spp, procedente de heces, se requiere una incubación a 42°C.
60. ¿Cuál es el virus más resistente a los agentes externos?
 A) Rinovirus.
 B) Coronavirus.
C) Adenovirus.
 D) Virus Sintetico Respiratorio.
61. La Tiña negra es producida por:
 A) *Malassezia furfur*
 B) *Tinea cruris*
C) Exophiala Werneckii
 D) *Tinea capitis*



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

62. Que opción es más compatible ante un paciente con la siguiente serología frente a hepatitis B: HBsAg +/ANTI- HBs -/HBeAg -/ANTI- Hbe +/ANTI- HbcIgM -/ANTI- HbcIgG +/DNA VHB +:
A) Infección crónica
B) Infección aguda
C) Paciente vacunado
D) Ninguna de las anteriores.
63. En un estudio de inmunidad celular a un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). ¿Qué tipo de Linfocitos T están aumentados?:
A) CD4
B) CD8
C) CD9
D) CD40
64. En la tinción de tinta china ¿de qué color vemos la cápsula del *Criptococo neoformans*?:
A) Rojo.
B) No se tiñe.
C) Negro.
D) Azul.
65. La muestra más adecuada para el diagnóstico del *Pneumocystis Jiroveci* es:
A) Exudado oral.
B) Sangre total.
C) Esputo Inducido.
D) Orina.
66. ¿Qué línea celular se utiliza para el cultivo del virus de la Gripe?
A) MRC5.
B) HEP-2.
C) MDCK.
D) RD.
67. La muestra que tiene mayor rendimiento para detectar virus respiratorios es el:
A) Exudado faríngeo.
B) Aspirado nasofaríngeo.
C) Lavado bronquial.
D) Lavado nasal.
68. ¿Cuál de los siguientes virus es ARN, con simetría icosaédrica y sin envoltura?
A) Flaviviridae.
B) Paramixoviridae.
C) Caliciviridae.
D) Arenaviridae.
69. Indica cuál de los siguientes microorganismos no es un hongo propiamente dicho (Reino Myceteae):
A) *Candida*
B) *Cryptococcus*
C) *Actinomyces*
D) *Aspergillus*
- 70.Cuál de las siguientes metodologías se emplea en la técnica de cribado de la infección por VIH:
A) Cultivo vírico.
B) Reacción de amplificación genómica por PCR.
C) Enzimoimmunoanálisis.
D) Western blot.
71. De los siguientes tipos de muestra, ¿cuál de ellas tiene mayor rendimiento diagnóstico para la detección del virus de la gripe A/H1 N1?:
A) Aspirado nasofaríngeo
B) Frotis nasal
C) Frotis faríngeo
D) Saliva
72. El primer anticuerpo que aparece en una infección por el virus de la hepatitis B es:
A) Anti-HBc
B) Anti-HBe
C) Anti-HBs
D) Anti-p24
73. El virión completo del virus de la hepatitis B se conoce como:
A) Antígeno Australia



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

- B) Partícula Delta
- C) Partícula de Dane**
- D) Partícula de Fagot

74. Todas las afirmaciones acerca de la hepatitis A son correctas excepto:

- A) Se transmiten por vía parenteral.**
- B) No se cronifica.
- C) Está producida por un virus de la familia de los picornavirus.
- D) La incidencia de infección por HVA se relaciona con malas condiciones higiénico-sanitarias.

75. De las siguientes características señale la falsa en la relación a los virus:

- A) Contienen material genético
- B) Tienen cubierta proteica
- C) Necesitan de una célula hospedadora
- D) Tienen metabolismo propio**

76. Con respecto al test de filamentación o del tubo germinal, señale la respuesta correcta:

- A) Es útil para diferenciar *Candida albicans* del resto de especies de *Candida*.
- B) Consiste en inocular varias colonias de levaduras en suero.
- C) Se incuba el suero a 37°C durante 2-4 horas.
- D) Todas son correctas.**

77. Con respecto a la determinación de carga viral de virus VIH, señale la afirmación incorrecta:

- A) Se trata de una amplificación del ADN del virus de la inmunodeficiencia humana.**
- B) La muestra debe ser recogida en tubo estéril con EDTA como anticoagulante.
- C) Es útil para la monitorización del tratamiento con antirretrovirales.
- D) Incluye una reacción de transcripción reversa.

78. De las siguientes técnicas, cuál puede ser utilizada en el diagnóstico de infección por virus:

- A) Inmunofluorescencia directa
- B) Enzimoimmunoensayo
- C) Amplificación por PCR (reacción en cadena de la polimerasa)
- D) Todas son ciertas**

79. Para el cultivo de virus se emplean:

- A) Medios de enriquecimiento.
- B) Medios sintéticos.
- C) Medios diferenciales.
- D) Ninguno de ellos.**

80. Si hablamos de un cimograma nos referimos a:

- A) Estudios de fermentación de azúcares para identificar hongos.**
- B) Estudios de características morfológicas de crecimiento de los hongos.
- C) Pruebas de sensibilidad de los hongos a antifúngicos.
- D) Estudios de las formas de reproducción de los hongos.

81. ¿Cuál de las siguientes características macroscópicas corresponde a *Candida albicans*?:

- A) Colonias lisas de color rosado y aspecto mucoso.
- B) Colonias mates, blancas y cremosas.
- C) Colonias blancas, lisas y brillantes.**
- D) Ninguna de las anteriores.

82. La temperatura óptima de crecimiento de la mayoría de los hongos de interés médico oscila entre:

- A) 15 a 20°C
- B) 25 a 30°C**
- C) 35 a 40°C
- D) 10 a 20°C

83. Ante la sospecha de infección por virus Zika, se recomienda descartar al menos:

- A) Malaria y Babesiosis.
- B) Dengue y Chikungunya.**
- C) Dengue y Ebola.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

D) Todas las anteriores.

84. ¿Cuál de los siguientes virus es RNA?:

A) Virus de la Hepatitis C.

B) Virus de la Hepatitis B.

C) Citomegalovirus.

D) Virus Herpes simple.

85. El ciclo biológico de un virus sigue las etapas:

A) Absorción- penetración- liberación y expresión del genoma viral.

B) Absorción- liberación- penetración y expresión del genoma viral.

C) Liberación-absorción-penetración y expresión del genoma viral.

D) Adsorción- penetración – liberación y expresión del genoma viral.

86. En relación a la determinación de la infección por VIH-2 señalar la respuesta correcta:

A) Actualmente la mayoría de los EIA pueden determinar anticuerpos frente a VIH-2.

B) Los Western Blot actuales suelen llevar alguna banda con antígenos frente a VIH-2.

C) No se puede determinar anticuerpos frente a VIH-2 por métodos EIA.

D) A y B son correctas.

87. Cuando debe de utilizarse la PCR en el diagnóstico de VIH:

A) Actualmente se emplea como primera prueba diagnóstica de la infección.

B) Para la confirmación de algunos Western Blot indeterminados.

C) Solo se emplea en laboratorios muy especializados.

D) Solo se emplea en el seguimiento de la infección.

88. Los métodos combinados en la primera prueba diagnóstica de detección de VIH, en los que se

determinan tanto antígeno como anticuerpos al mismo tiempo tienen como objetivo:

A) No tener que realizar pruebas de confirmación.

B) Disminuir el periodo ventana en los nuevos contagiados.

C) Confirmar resultados positivos.

D) Determinar el genoma del virus presente en el líquido cefalorraquídeo.

89. En relación a los métodos de identificación de hongos, señale la afirmación correcta:

A) Los medios cromogénicos habituales permiten la identificación definitiva de *Candida albicans*, *Candida tropicalis* y *Candida krusei*.

B) El medio de Sabouraud, muy rico en glucosa y con pH bajo, permite el crecimiento de las bacterias, por lo que su uso con frotis vaginales requiere la adición de antibióticos como el cloranfenicol o la gentamicina.

C) Los dermatofitos son sensibles a la cicloheximida (Actidiona®), al contrario que muchos hongos saprofitos, por lo que este antifúngico puede añadirse al medio de Sabouraud para diferenciarlos.

D) Cuando se sospecha la implicación de levaduras lipofílicas, como las del género *Malassezia*, debe emplearse el medio de Sabouraud enriquecido con ácidos grasos de cadena corta (omega-6).

90. Respecto a los principales tipos de micosis, señale la sentencia verdadera:

A) La mayoría de micosis superficiales, limitadas al estrato queratinizado de la piel, están producidas por levaduras del género *Candida*.

B) La especie más frecuentemente aislada en las candidiasis vaginales es *Candida glabrata*.

C) Los hongos dermatofitos antropofílicos suelen producir lesiones inflamatorias más floridas que aquellos cuyo hábitat natural son los animales o el suelo (zoofílicos o geofílicos).

D) Las micosis sistémicas oportunistas están producidas por hongos no patógenos, cuyo hábitat



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

puede ser el medio ambiente, como *Aspergillus* o *Fusarium*.

91. Por lo general se considera que el método diagnóstico dotado de la mayor sensibilidad frente a las micosis es:

- A) Asilamiento del hongo mediante cultivo.
- B) La tinción de calcofluor.
- C) El estudio del metabolismo respiratorio del hongo.
- D) La inmunodifusión radial.

92. ¿Qué son los viriones?

- A) Proteínas víricas
- B) Virus maduros liberados al exterior de la célula
- C) Virus helicoidales
- D) Virus causantes de encefalitis

93. ¿Cuál de estos medios permite evaluar la capacidad de algunos hongos para hidrolizar la urea, siendo de gran utilidad en su identificación?

- A) Agar urea-arginina
- B) Agar Sabouraud
- C) Agar urea de Ferguson
- D) Medio de Czapek

94. El virus que produce la gripe estacional es:

- A) Virus influenza.
- B) Rubivirus.
- C) Poliovirus.
- D) Herpesvirus.

95. Los hongos son:

- A) Organismos eucariotas.
- B) Parásitos celulares estrictos.
- C) Organismos procariotas.
- D) Organismos que no se pueden aislar en medios de cultivo in vitro.

96. La prueba del tubo germinal se utiliza para la identificación de:

- A) Hongos dermatofitos.

- B) Micobacterias.
- C) Enterobacterias.
- D) *Candida albicans*.

97. El virus de la rubeola pertenece a la familia de los:

- A) Rhabdovirus.
- B) Togavirus.
- C) Ortomixovirus.
- D) Paramixovirus.

98. La carga viral del virus de la hepatitis C se determina mediante:

- A) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
- B) Espectrofotometría.
- C) Nefelometría.
- D) Aglutinación.

99. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es más probable su aparición en pacientes inmunodeprimidos?:

- A) *Escherichia coli*.
- B) *Candida albicans*.
- C) *Staphylococcus aureus*.
- D) Citomegalovirus.

100. Es falso que los virus:

- A) Están formados por ácido nucleico, cápside y en algunos casos envoltura externa.
- B) Su ácido nucleico puede ser ADN o ARN.
- C) Se multiplican fuera de la célula.
- D) Pueden infectar animales, plantas y bacterias.

101. Es un método de identificación de virus:

- A) Microscopía electrónica.
- B) Radioinmunoanálisis.
- C) Sondas de hibridación.
- D) Hay más de una respuesta correcta.

102. Un resultado positivo en la detección de anticuerpos específicos frente al VIH mediante una técnica de EIA:

- A) Es diagnóstico de infección por VIH.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

B) Debe confirmarse por western-blot.

C) Debe confirmarse mediante cuantificación del ARN-VIH-1 en plasma.

D) Si el ARN-VIH-1 en plasma es negativo, el paciente no es transmisor de la infección.

103. La fase de la infección aguda por VIH inicia en el momento de la infección, el virus se propaga por el cuerpo de la persona infectada a través de sus fluidos corporales, en un plazo de días, el VIH infecta no sólo las células expuestas inicialmente sino también a los ganglios linfáticos. El tejido linfóide constituye uno de los principales espacios del cuerpo humano donde tiene lugar la reproducción inicial del VIH por su alto porcentaje de linfocitos T ...

A) CD4

B) CD8

C) CD9

D) CD40

104. ¿Qué prueba realizaría para el diagnóstico de aspergilosis invasiva?

A) Detección del antígeno manano.

B) Detección del antígeno galactomanano.

C) Detección de anticuerpos antimanano.

D) Detección de anticuerpos antimicelio.

105. ¿Cuál de las siguientes tinciones no se utiliza para el examen microscópico de hongos?

A) KOH.

B) Blanco de calcoflúor.

C) Azul de lactofenol.

D) Azul de metileno.

106. Los medios de transporte de muestras para estudio de virus deben tener todas las siguientes características, excepto:

A) Contener un tampón para estabilizar el pH.

B) Contener un antimicrobiano para inhibir el crecimiento de bacterias y hongos.

C) Deben ser medios semisólidos.

D) Contener proteínas para estabilizar los virus.

107. Indique cuál, de los siguientes, no se utiliza como método de estudio de los virus:

A) Crecimiento en cultivos celulares.

B) Microscopía óptica.

C) Detección de antígeno mediante IFD (Inmunofluorescencia Directa).

D) Detección del genoma vírico.

108. La mayoría de los casos de mononucleosis infecciosa está producida por:

A) Citomegalovirus.

B) Adenovirus.

C) Virus de Epstein-Barr.

D) Parvovirus.

109. Señale cuál, de estas técnicas de identificación genotípica de microorganismos, consiste en detección de ácidos nucleicos con amplificación de la diana:

A) PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa.)

B) Hibridación con sondas.

C) Arrays.

D) LiPA (Hibridación Inversa).

110. La mayoría de cultivos para hongos se deben incubar a:

A) 25°C.

B) 30°C.

C) 37°C.

D) 40°C

111. El agente causal de la tiña negra es:

A) Trichosporon inkin.

B) Malassezia furfur.

C) Hortaea werneckii (anteriormente: Exophiala werneckii).

D) Trichosporon mucoides.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

112. ¿Cuál de los siguientes virus es causante de un síndrome mononucleósico sin presencia de anticuerpos heterófilos?:

- A) Virus de Epstein Barr.
- B) Citomegalovirus.
- C) Virus del herpes simple.
- D) Herpesvirus humano tipo 8.

113. El micelio es típico de:

- A) Artrópodos
- B) Parásitos
- C) Hongos
- D) Todas son ciertas.

114. El virus de la inmunodeficiencia humana VIH pertenece:

- A) Adenovirus
- B) Retrovirus
- C) Parvovirus
- D) Rotavirus

115. Método utilizado para carga viral en VHB y VHC.

- A) PCR competitiva.
- B) PCR a tiempo real.
- C) bDNA.
- D) Todas son ciertas.

116. ¿Cuál de los siguientes medios NO se utiliza para aislamiento de hongos?

- A) Agar Sabouraud
- B) Agar extracto de malta
- C) Agar DTM
- D) Agar Levine

117. ¿Cuál de estos microorganismos NO es una bacteria?

- A) Staphylococcus aureus.
- B) Mycobacterium leprae.
- C) Chlamydia trachomatis.
- D) Candida albicans.

118. ¿Por qué tipo de ácido nucleico pueden estar compuestos los virus?

- A) Únicamente ARN
- B) Únicamente ADN
- C) ARN o ADN
- D) ARN y ADN

119. La temperatura óptima de crecimiento para la mayoría de los hongos patógenos es de ...

- A) 36,5 °C
- B) 37 °C
- C) Temperatura ambiente
- D) 30 °C

120. La varicela está producida por:

- A) Streptococcus pyogenes
- B) Streptococcus grupo A
- C) Herpesvirus
- D) Streptococcus viridans

121. La carga viral del VIH se realiza principalmente en:

- A) Plasma EDTA
- B) Plasma citratado
- C) Plasma aprotinina
- D) Suero

122. El Cryptococcus neoformans:

- A) Es un hongo
- B) Carece de cápsula
- C) No crece en agar sabouraud
- D) Tiene tres flagelos distales

123. La prueba de Western-blot se usa para:

- A) La detección de antígenos del VHC
- B) La detección de anticuerpos del VHD
- C) La confirmación del VIH
- D) La confirmación de VHC

124. El núcleo de los virus es redondo:

- A) Falso, es helicoidal
- B) Falso, es de forma variable
- C) Falso, carecen de núcleo
- D) Verdadero



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

125. De los virus, es una característica:

- A) Presentar pared celular.
- B) No tener síntesis proteica.**
- C) Tener capacidad de generar energía.
- D) Crecer en medios artificiales.

126. Si se sospecha de la presencia de *Cryptococcus neoformans* ¿qué tipo de tinción utilizarías para evidenciarla?

- A) Tinción con azul de metileno.
- B) Tinción con verde de malaquita.
- C) Tinción con tinta china.**
- D) Tinción de Gram.

127. Señale la CORRECTA:

- A) El virus de la hepatitis A es un virus ARN y pertenece a la familia de los picornavirus.**
- B) El virus de la hepatitis B es un virus ARN y pertenece a la familia de los hepadnavirus.
- C) El virus de la hepatitis C es un virus ADN y pertenece a la familia de los flaviviridae.
- D) A y C son correctas.

128. La carga viral es:

- A) Cuantificación en suero del ARN viral en pacientes infectados por VIH.
- B) Cuantificación en suero del ADN viral en pacientes infectados por VIH.
- C) Cuantificación en plasma del ARN viral en pacientes infectados por VIH.**
- D) Cuantificación en plasma del ADN viral en pacientes infectados por VIH.

129. Existen varios tipos de esporas sexuales. Cita cuál NO es una espora sexual:

- A) Zigospóra.
- B) Artrospóra.**
- C) Oospóra.
- D) Ascospóra.

130. Según la clasificación de los hongos, los filamentosos y no tabicados pertenecen al grupo de:

- A) Dicaryomicotina.
- B) Zygomycotina.**
- C) Deuteromicotina.
- D) Esporomicotina.

131. ¿Qué secuencia del virus VIH amplifica el método RT-PCR?

- A) El gen pang.
- B) El gen 18.
- C) El gen gag.**
- D) El gen SK.

132. La reproducción asexual de hongos se produce por:

- A) La fusión de dos núcleos haploides sexualmente diferentes.
- B) La fusión de dos núcleos diploides diferentes.
- C) Fragmentación.**
- D) No existe reproducción sexual en hongos.

133. El virus del SIDA se encuentra intracelularmente en:

- A) Linfocitos T4.
- B) Células de glía.
- C) Macrófagos.
- D) Todas son correctas.**

134. La Pitiriasis versicolor está producida por:

- A) Ácaro.
- B) Hongo.**
- C) Parásito.
- D) Protozoo.

135. ¿Cuál de los siguientes métodos diagnósticos considera más adecuado para el diagnóstico de la gripe?

- A) Cultivo en medios celulares.
- B) Detección de antígenos mediante ELISA.
- C) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

D) Detección antígenos mediante
Inmunofluorescencia indirecta.

- A) Paramixoviridae
- B) Orthomyxoviridae**
- C) Picornaviridae
- D) Parvoviridae

136. La técnica de laboratorio fundamental para el diagnóstico de una fiebre hemorrágica viral en la práctica clínica es

- A) Cultivo viral.
- B) Serología.
- C) PCR.**
- D) Detección de antígeno en orina

137. ¿Cuál es el patógeno productor de diarrea más frecuente en niños menores de 2 años?

- A) Giardia lamblia.
- B) Rotavirus.**
- C) Helicobacter pylori.
- D) Campylobacter jejuni

138. La reacción de Paul-Bunnell es positiva en la:

- A) Tuberculosis
- B) Hepatitis A
- C) Brucelosis
- D) Mononucleosis infecciosa**

139. ¿Cuál es el análisis de confirmación que más se usa para el diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida?

- A) ELISA
- B) IRMA
- C) RIA
- D) Western blot**

140. ¿Cómo se llama la infección micótica superficial que produce la Malassezia furfur?

- A) Tiña versicolor**
- B) Tiña negra
- C) Piedra negra
- D) Piedra blanca

141. ¿A qué familia pertenece el virus Influenza A o Alphainfluenzavirus?

142. ¿Cuál de estos hongos es una levadura?:

- A) Aspergillus spp.
- B) Dermatofitos.
- C) Pennicilium spp.
- D) Candida spp.**

143. Señale la respuesta correcta, los hongos son microorganismos:

- A) Eucariotas.**
- B) Procariotas.
- C) Polimórficos.
- D) Autótrofos.

144. El virus de la inmunodeficiencia humana VIH infecta a las células que tienen en su superficie la molécula CD4. ¿A través de qué proteína se une específicamente?

- A) gp41
- B) gp120**
- C) p17
- D) p24

145. El agar Sabouraud es adecuado para el crecimiento de:

- A) Cocobacilos Gram positivo.
- B) Parásitos intracelulares.
- C) Enterobacterias.
- D) Levaduras.**

146. La transmisión del virus VIH de la madre al feto durante el embarazo, se denomina:

- A) Transmisión horizontal.
- B) Transmisión oblicua
- C) Transmisión vertical.**
- D) Transmisión vectorial.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

147. De entre las siguientes ¿cuál es la causa más frecuente de infección fúngica del sistema nervioso central?

- A) Haemophilus influenzae
- B) Neisseria meningitidis
- C) Listeria monocytogenes
- D) Cryptococcus neoformans**

148. ¿De qué tipo es el material genético del virus varicela-herpes zoster?

- A) ADN monocatenario
- B) ADN bicatenario**
- C) ARN monocatenario
- D) ARN bicatenario

149. El virus Epstein-Barr (VEB) es un virus DNA que se relaciona con:

- A) Infecciones urinarias.
- B) Mononucleosis infecciosa.**
- C) Cistitis hemorrágicas en inmunodeprimidos.
- D) Gastroenteritis aguda en lactantes.

150. En cuanto a los perfiles serológicos para bacterias, virus, parásitos y hongos, señala la correcta:

- A) Para medir la IgG una muestra extraída en la fase aguda es necesaria.
- B) Para medir la IgM una muestra extraída en la fase aguda es necesaria.**
- C) Para medir la IgG o IgM e IgG se necesita 1 suero seriado en la fase aguda y convalecencia.
- D) Todas son correctas.

151. A continuación, señala la opción que no corresponde con una espora sexual

- A) Zigospora
- B) Oospora
- C) Arcosporas
- D) Artrosporas**

152. De los siguientes enunciados cuales corresponden a técnicas moleculares de amplificación utilizadas para la detección y cuantificación de VIH-1

- A) Amplicor HIV-1 monitor (retrotranscripción y amplificación o RT-PCR).
- B) RT-PCR en tiempo real (cobas Taqman, Roche. Abbott real time. Abbot)
- C) Método del ADN ramificado (bADN)
- D) Todas son correctas**

153. En la infección por VIH se puede diagnosticar en el laboratorio mediante la determinación del antígeno viral. Señala la respuesta incorrecta

- A) La detección del antígeno viral P24 es un marcador de pronóstico favorable.**
- B) La detección del antígeno viral P24 se puede realizar en los linfocitos de los pacientes afectados.
- C) La detección del antígeno viral P24 indica replicación activa.
- D) La determinación del antígeno viral P24 se detecta durante la infección aguda por el virus.

154. La identificación del ácido nucleico viral es una de las técnicas para el diagnóstico de infección por VIH. Una de sus características es

- A) No nos permite detectar la infección en los estadios iniciales.
- B) Es una técnica muy sensible que permite detectar la infección en los casos que los anticuerpos aún no están presentes.**
- C) La técnica se basa en el aislamiento de células mononucleadas de sangre periférica del paciente.
- D) La identificación del ácido nucleico viral es un método indirecto de diagnóstico de laboratorio en la infección por VIH,

155. ¿Cuál de las siguientes técnicas para la detección del Sars-Cov2 es cualitativa?

- A) Prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR).
- B) Pruebas de antígenos.
- C) Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
- D) Todas son ciertas.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

156. En el agar Sabouraud, ¿para qué se utiliza la cicloheximida?

A) Para evitar el crecimiento de virus que contaminen

B) Para evitar el crecimiento de hongos contaminantes.

C) Para saber cómo se nutre el hongo que vamos a estudiar

D) Todas son falsas

157. La muestra correspondiente, ante una sospecha de onicomycosis, se incuba en

A) Agar Mycosel

B) Medio Simmons

C) Citrato

D) Mueller-Hinton

158. La enfermedad de "los cuidadores de los rosales" es producida por:

A) *Sporothrix schenckii*.

B) *Malassezia furfur*.

C) *Exophiala werneckii*.

D) *Cryptococcus neoformans*.

159. Señala la correcta si hablamos del mecanismo de reproducción de los hongos

A) Todas son correctas

B) Reproducción sexual

C) Reproducción asexual

D) Reproducción parasexual

160. Los hongos que tienen una reproducción asexual, los denominamos

A) Hongos semiperfectos.

B) Hongos imperfectos.

C) Hongos con filamentos.

D) Hongos Zygomycóticos.

161. Un estudio de diagnóstico viral es el cultivo de virus. ¿Qué técnica de las siguientes se emplea para dicho cultivo?

A) Cultivo en tejido muerto.

B) Estudios membranosos.

C) Cultivos celulares.

D) Aislamiento restringido.

162. Señala la afirmación correcta cuando hablamos de serología viral

A) Para la serología la muestra de sangre se recoge en tubos con anticoagulantes.

B) Uno de los test empleados en el estudio de serología viral es la desnaturalización.

C) A través de la serología viral no se puede identificar si una infección está en proceso agudo o crónico

D) Dos de los test que se pueden emplear en el estudio de serología viral son: fijación del complemento e inhibición de la hemaglutinina.

163. Ante el diagnóstico de laboratorio sobre el virus de la rabia

A) El diagnóstico de laboratorio se puede realizar mediante identificación de los corpúsculos de Negri.

B) Los cuerpos de Negri son diagnósticos de la rabia y siempre se detectan en tejidos cerebrales infectados.

C) Una de las técnicas utilizadas para el diagnóstico de laboratorio de la rabia es el aislamiento del virus y se realiza inoculando una muestra de sangre.

D) Todas son correctas.

164. Ante el diagnóstico de laboratorio del virus de la varicela Zóster

A) La determinación de anticuerpos contra el virus de la varicela zóster nos permite saber si el paciente ha pasado la enfermedad, pero no conoceremos la inmunidad frente al virus.

B) En su cultivo se toman muestras de vesículas recientes.

C) A través de su estudio citológico se pueden detectar las células enanas típicas

D) En su estudio citológico el frotis se tiñe con el método Gemma.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

165. ¿Cuál de las siguientes tinciones es utilizada para la identificación de hongos?

- A) Eosina.
- B) KOH (Hidróxido de potasio) al 10 %.
- C) Romanovsky.
- D) Azul de calco flúor.

166. Señale la respuesta correcta en relación a los hongos:

- A) Son microorganismos procariotas.
- B) Pueden crecer de forma levaduriforme o micelial.
- C) Realizan la fotosíntesis.
- D) Se reproducen exclusivamente de forma asexual.

167. Identifica que enfermedad no corresponde con micosis:

- A) Candidiasis.
- B) Histoplasmosis.
- C) Echinococosis.
- D) Criptococosis.

168. En relación al envío de muestras clínicas de pacientes que cumplen la definición de caso de gripe, señale la respuesta incorrecta:

- A) Según las recomendaciones de la OMS, el envase exterior para envío de muestras clínicas o microorganismos vivos de la categoría B, a los laboratorios de virología asociados a la red centinela, deberán contener en su etiquetado el número UN3375.
- B) Se deberá utilizar el sistema de triple embalaje básico para su transporte, compuesto por los tres niveles de contención recomendados por la OMS.
- C) El recipiente primario contiene el virus aislado o muestra clínica. Debe ser estanco, a prueba de filtraciones y estar etiquetado. Debe envolverse en material absorbente suficiente para retener todo el fluido en caso de ruptura
- D) El recipiente secundario encierra y protege al primario. Debe ser estanco, a prueba de filtraciones, irrompible, con tapa de cierre hermético o una bolsa hermética.

169. La determinación positiva de Paul Bunnell en una muestra, indica presencia de:

- A) Salmonelosis.
- B) Rubeola.
- C) Varicela.
- D) Virus de Epstein-Barr.

170. ¿Qué característica no corresponde al virus del VIH?

- A) Es un virus ADN.
- B) Ataca fundamentalmente los linfocitos T4.
- C) Tiene una transcriptasa inversa.
- D) Consta de nucleocápside y envoltura.

171. El virus de la rubeola pertenece a la familia de los:

- A) Rhabdovirus.
- B) Togavirus.
- C) Ortomixovirus.
- D) Paramixovirus.

172. Indique cuál de los siguientes virus es DNA:

- A) Virus de la hepatitis C.
- B) Virus respiratorio sincitial.
- C) Virus del herpes simple.
- D) Rotavirus.

173. El enterobius vermicularis es:

- A) Un virus perteneciente a la clase de los nematodos.
- B) Un gusano perteneciente a la clase de los nematodos.
- C) Un gusano perteneciente a la clase de los cestodos.
- D) Un gusano perteneciente a la clase de los trematodos.

174. De los siguientes virus, indique cuál no es un herpesvirus:

- A) Virus del Sarampión.
- B) Virus Epstein-Barr.
- C) Citomegalovirus.
- D) Virus de la varicela zoster.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

175. Indique cómo se denomina el ciclo reproductivo de un virus en el que se produce la muerte del huésped:

- A) Ciclo lisogénico.
- B) Ciclo lítico.**
- C) Ciclo replicativo.
- D) Ciclo de Adsorción.

176. Es un método indirecto para la identificación de virus:

- A) Sondas de hibridación.
- B) Inmunofluorescencia directa.
- C) Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).
- D) Inhibición de la hemoaglutinación.**

177. Es cierto que el VIH1:

- A. Es un virus RNA.**
- B) Es un virus DNA.
- C) Es un virus RNA que no necesita transcripción inversa para formar DNA
- D) Es un virus DNA que necesita retrotranscribirse en su ciclo replicativo

178. Los virus:

- A) Pueden crecer en medios de cultivo convencional en condiciones especiales de humedad.
- B) Crecen siempre, aunque lentamente
- C) Pueden crecer en cultivos tisulares, huevos embrionados o animales experimentales.**
- D) No se pueden cultivar.

179. Por lo general, se considera que el método diagnóstico de mayor sensibilidad frente a las micosis es:

- A) El aislamiento del hongo en un cultivo en atmósfera aeróbica incubado durante 24-48 h.
- B) El aislamiento del hongo en un cultivo en atmósfera anaeróbica incubado durante 24-48 h.
- C) El aislamiento del hongo en un cultivo en atmósfera aeróbica incubado durante 2 semanas.**
- D) El aislamiento del hongo en un cultivo en atmósfera anaeróbica incubado durante 2 semanas.

180. Son hongos miceliares cuyas hifas no tienen septos:

- A) Hifomicetos.
- B) Basidiomicetos.
- C) Zigomicetos.**
- D) Ascomicetos.

181. Se considera una micosis profunda la infección fúngica siguiente:

- A) Candidiasis cutánea.
- B) Histoplasmosis.**
- C) Micetomas.
- D) Dermatofitosis.

182. ¿Cuál de estos virus es RNA?

- A) Virus de la Hepatitis B.
- B) Virus del Herpes simple.
- C) Citomegalovirus.
- D) Virus de la Hepatitis C.**

183. De las siguientes patologías producidas por hongos. ¿Cuál se desarrolla preferentemente en los pulmones?

- A) Cromoblastomycosis.
- B) Tiña negra palmar.
- C) Micetoma.
- D) Aspergilosis.**

184. ¿Qué es un efecto citopático observable en un cultivo celular inoculado con virus?

- A) La capacidad que tienen los virus para unirse con los anticuerpos a través de su citoplasma.
- B) La unión morfológica de un virus y un anticuerpo.
- C) El cambio morfológico en las células resultante de una infección vírica.**
- D) Si las células se mantienen en cultivo no pueden ser infectadas por virus.

185. El medio de cultivo Sabouraud, se utiliza para aislamiento de:

- A) Staphylococcus.
- B) Listerias.
- C) Levaduras.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

D) Enterobacterias.

186. Cuando observamos una microconidia al microscopio. ¿A qué microorganismos se hace referencia?

- A) Parásitos
- B) Virus
- C) Hongos**
- D) Bacterias

187. Para el cultivo de virus se emplean:

- A) Medios de enriquecimiento.
- B) Medios selectivos.
- C) Medios diferenciales.
- D) Cultivos celulares.**

188. En micología, la tinción específica para polisacáridos y glucógeno es:

- A) Tinción de Giemsa.
- B) Tinción de Pas.**
- C) Tinción argéntica.
- D) Tinción de Panóptico.

189. La prueba microbiológica que permite determinar la capacidad de una levadura para asimilar diferentes nutrientes presentes en un medio de cultivo se denomina:

- A) Auxonograma.**
- B) Microdilución.
- C) Antifungigrama.
- D) Microcultivos.

190. La tinción de azul de lactofenol se utiliza principalmente para:

- A) Visualización de la cápsula bacteriana.
- B) El examen de hongos.**
- C) Identificación de protozoos fecales.
- D) Observación de helmintos en heces.

191. La muestra más adecuada para el diagnóstico de una enfermedad producida por un rotavirus es:

- A) Exudado faríngeo.
- B) Líquido cefalorraquídeo.

C) Heces.

D) Raspado corneal.

192. ¿Durante cuánto tiempo deben incubarse los cultivos de hongos antes de proceder a desecharlos?:

- A) Durante 1 semana.
- B) Durante 3-4 semanas.**
- C) Durante 3-4 meses.
- D) No es necesaria la incubación.

Explicación. Pego tal cual lo que dice la SEIMC al respecto: "Los cultivos de hongos deben incubarse durante 3-4 semanas antes de ser desechados, y no deben desecharse cuando se aísla un hongo, sino que debe completarse el periodo de incubación. Sin embargo, hay muestras que se pueden eliminar antes (por ejemplo, exudado vaginal), a los 7 días, cuando se realizan cultivos habituales"

193. La detección del antígeno galactomanano es útil para el diagnóstico de:

- A) Criptococosis.
- B) Candidiasis.
- C) Aspergilosis invasiva.**
- D) Histoplasmosis.

194. ¿Cuál de estas asociaciones NO es correcta?:

- A) Parotiditis - Virus DNA.**
- B) Sarampión - Virus RNA.
- C) VIH - Virus RNA.
- D) Hepatitis B - Virus DNA.

195. ¿Cuál de los siguientes virus producen anticuerpos heterófilos?:

- A) Virus de la Hepatitis B.
- B) Citomegalovirus.
- C) Virus de Epstein-Barr.**
- D) Virus de varicela Zóster.

196. Tras leer un artículo sobre la variante Delta del SARS- COV-2 y su comportamiento epidemiológico, he entendido perfectamente la



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

definición de virulencia que aporta la OMS, que es la siguiente:

A) El grado de agresividad de un virus, indicado por las tasas de incidencia y por su capacidad para invadir y lesionar los tejidos del huésped, o ambos parámetros.

B) El grado de toxicidad de un virus, indicado por las tasas de incidencia y por su capacidad para invadir y lesionar los tejidos del huésped, o ambos parámetros.

C) El grado de patogenicidad de un agente infeccioso, indicado por las tasas de letalidad y por su capacidad para invadir y lesionar los tejidos del huésped, o ambos parámetros.

D) El grado de agresividad de un agente infeccioso, indicado por las tasas de incidencia acumulada y por su capacidad para invadir y lesionar los tejidos del huésped, o ambos.

197. Se llaman virus desnudos a aquellos que:

A) Carecen de envoltura.

B) Carecen de nucleóide.

C) Carecen de cápside.

D) Carecen de ADN o ARN.

198. El virus de la rubeola:

A) Es un virus AON que pertenece a la familia Rhabdoviridae.

B) Es un virus ARN que pertenece a la familia Filoviridae.

C) Es un virus ARN que pertenece a la familia Poxviridae.

D) Es un virus ARN que pertenece a la familia Togaviridae.

199. En cuanto a los medios de cultivo de virus, para mantener las mismas condiciones fisiológicas in vitro como in vivo, se utiliza:

A) Caldo infusión cerebro corazón (BHI).

B) Caldo de triptona de soja (TSB).

C) Solución de sales equilibrada (BSS).

D) Solución de Lugol.

200. ¿Cuál de las siguientes NO es una función de la pared celular bacteriana?

A) Ayuda a mantener la morfología de la célula.

B) Está implicada en la patogenicidad de la bacteria.

C) Determina su movilidad.

D) Permite el paso selectivo de algunas sustancias.

201. La amplificación del genoma vírico mediante PCR:

A) Requiere la presencia de células vivas para su realización.

B) Solo se realiza con muestras bacterianas.

C) Requiere previamente la extracción del ácido nucleico.

D) Todas son ciertas.

202. Los virus del género Enterovirus y Rhinovirus pertenecen a la familia:

A) Reoviridae.

B) Togaviridae.

C) Arenaviridae.

D) Picornaviridae.

203. Un auxonograma de levaduras consiste en:

A) Una batería de pruebas bioquímicas.

B) La determinación del antimicótico más efectivo.

C) Un pre-enriquecimiento.

D) Un tipo de siembra.

204. ¿Qué característica corresponde a los virus?

A) Son parásitos obligados.

B) Su material genético puede ser ADN o ARN.

C) El material genético está encerrado en una cubierta proteica.

D) Todas son ciertas.

205. Los hongos son organismos:

A) Heterótrofos.

B) Autótrofos.

C) Quimioautótrofos.

D) Mixótrofos.

206. Si buscamos una técnica de cultivo y aislamiento de virus, ¿cuál de las siguientes utilizaríamos?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

A) Método RIA.

B) Método ELISA.

C) Técnica de inoculación en embrión de pollo.

D) Determinación de inmuoglobulinas M.

207. Según su genoma, los virus se pueden clasificar en:

A) Helicoidales.

B) Ribovirus.

C) Desoxirribovirus.

D) B y C son correctas.

208. Los virus:

A) Son sensibles a los antibióticos.

B) Tienen un tamaño superior a 500 nm.

C) Son parásitos intracelulares obligados.

D) Carecen de nucleocápside.

209. ¿Cuál de estas técnicas es la que más se emplea para el análisis de confirmación del diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida?

A) Técnica de inmunofluorescencia directa.

B) Inmunocromatografía.

C) Técnica de Western-Blot.

D) Técnica de inmunofluorescencia indirecta.

210. La técnica de elección para el diagnóstico de herpes virus en la afectación del Sistema Nervioso Central, será:

A) Anticuerpos IgM.

B) PCR a tiempo real.

C) Anticuerpos IgG.

211. ¿Cuál de estos virus NO pertenece a la familia herpes virus?:

A) Adenovirus.

B) Citomegalovirus.

C) Varicela Zoster.

212. Para investigar el posible agente etiológico de una meningitis aséptica en esta paciente de 2 años de edad ¿Qué técnica diagnóstica de las que siguen es la indicada?

A) Detección de anticuerpos IgG e IgM.

B) Detección de ARN vírico mediante técnicas moleculares.

C) Realización de antígenemia.

213. ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada como método confirmatorio de diagnóstico del VIH?:

A) Wester-blot.

B) Inmunofluorescencia indirecta (IFI).

C) Inmunoensayo lineal (LIA).

214. ¿Cuál es el método más empleado en las pruebas de cribado de VIH?:

A) Enzimoinmunoensayo (EIA).

B) PCR.

C) Cultivos celulares.

215. Para el cribado de anticuerpos VIH, deben utilizarse reactivos que detecten:

A) Únicamente Anticuerpos VIH-1.

B) Únicamente Anticuerpos VIH-2.

C) Anticuerpos VIH-1 y VIH-2.

216. Un hongo dimórfico es aquel que:

A) Forma protoplastos.

B) Produce artrosporas y clamidosporas.

C) Puede crecer como levadura o como moho.

D) Se reproduce sexual y asexualmente.

217. Para la identificación al microscopio de los hongos se utilizan distintos métodos, señala cuál es el más empleado para una detección rápida:

A) Tinta china.

B) Tinción Giemsa.

C) KOH (Hidróxido de potasio).

D) PAS (Ácido peryódico de Schiff)

218. Para el cultivo de virus necesitamos cultivos celulares y estos pueden ser, dependiendo de las células que los constituyen:

A) Primarios.

B) Diploides.

C) Aneuploides o continuos.

D) Todas son correctas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

219. ¿Cuál de las técnicas siguientes para la detección de Sars-Cov2 es cualitativa?

- A) Prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RTPCR).
- B) Prueba de antígenos.
- C) Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés).
- D) Todas son correctas.**

Comentario. Aunque muchas PCR son cuantitativas, algunas no lo son. Y dentro de las que son cuantitativas también se puede expresar su resultado de forma cualitativa (negativo/positivo).

220. Las micosis que se desarrollan con lesiones no dolorosas en pelo, piel o uñas se denominan:

- A) Superficial o cutáneas.**
- B) Subcutáneas.
- C) Sistémicas.
- D) Oportunistas.

221. Tenemos un paciente del que se sospecha micosis invasiva, que pruebas serológicas de las siguientes realizaremos:

- A) Detección de (1-3) β -D-glucano.
- B) Detección del antígeno galactomanano.
- C) Ninguna de las anteriores.
- D) A) y b) son correctas.**

222. Respecto a la pregunta anterior, obtenemos como resultado que hay detección del antígeno galactomanano, esto nos indicará que estamos ante una micosis invasiva por:

- A) Cándidas.
- B) Aspergillus.**
- C) Cryptococcus.
- D) Pneumocysti jiroveci.

223. Un hongo dimórfico es aquel que:

- A) No le afecta la temperatura de incubación.
- B) Crece a 37°C en forma de levadura y entre 25-30°C formando colonias filamentosas.**
- C) Crece solo a 37°C de incubación.
- D) Crece solo entre 25-30°C de incubación.

224. ¿Cuál es la población de linfocitos que ataca específicamente el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida (VIH o SIDA)?

- A) Linfocitos CD3 + del timo.
- B) Linfocitos TH auxiliares, cooperadores, CD4 +o T4 .**
- C) Linfocitos Ts supresores y Te citotóxicos, CD8 +o Ts.
- D) Células NK agresoras naturales (natural killer) CD16 +y CD56 +.

225. El virus de Epstein-Barr es...

- A) ...neurotrópico.
- B) ...linfotrópico.**
- C) ...dermatrópico.
- D) ...miotrópico.

226. Los coronavirus están formados por...

- A) ...cadenas de ADN con simetría helicoidal.
- B) ... cadenas de ADN con simetría icosaédrica.
- C) ... cadenas de ARN con envoltura.**
- D) ... cadenas de ARN sin envoltura.

227. ¿Qué son las hifas?

- A) Virus.
- B) Bacterias aerobias.
- C) Hongos.**
- D) Bacterias anaerobias.

228. ¿Cuál de los siguientes virus es ARN?

- A) Citomegalovirus.
- B) Virus Zika.**
- C) Virus de la Hepatitis B.

229. ¿Qué método utilizaría para diagnosticar en el laboratorio una aspergilosis invasiva?

- A) Detección del antígeno galactomanano.**
- B) Detección del antígeno manano.
- C) Detección de ureasa.
- D) Prueba de la fenol-oxidasa.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

230. ¿Cuál de los siguientes virus pertenece a la familia Retroviridae?:

- A) Virus hepatitis B (VHB)
- B) Virus herpes simple (VHS)
- C) Virus inmunodeficiencia humana (VIH)**
- D) Adenovirus (ADS)

231. Indique cuál de los siguientes medios de cultivo es un medio cromogénico para la identificación presuntiva de Cándidas:

- A) Sabouraud
- B) Sabouraud con clorafenicol
- C) Sabouraud con gentamicina
- D) CHROMagarTM Cándida**

232. ¿Cuál de estas enfermedades es producida por un virus?

- A) El Tracoma
- B) La Tosferina
- C) Fiebre hemorrágica**
- D) Cólera

233. El citomegalovirus humano (CMV), ¿a qué especie pertenece?

- A) Alphaherpesvirus
- B) Betaherpesvirus**
- C) Gammaherpesvirus
- D) Deltaherpesvirus

234. Según el método Baltimore, divide a los virus en diferentes categorías, según el ácido nucleico que poseen. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- A) El grupo de los viroides, son agentes subvirales formados por hebras de ADN circular desnudas
- B) El grupo VI, son virus con ARN de transcripción reversa (ssRNA-RT)**
- C) El grupo de los priones, éstos pueden transmitirse de forma vertical, pero de forma horizontal porque poseen ADN bicatenario
- D) El grupo IV, son virus con ARN de transcripción inversa, de sentido negativo

235. Respecto al virus del VIH, la penetración del VIH en su célula hospedadora tiene lugar por:

- A) Fagocitosis.
- B) Pinocitosis.
- C) Fusión de membrana.**
- D) Transporte activo.

236. Un resultado positivo mediante la técnica de Paul-Bunnell-Davidsohn en una muestra, indica presencia de:

- A) Campylobacter.
- B) Rubeola.
- C) Varicela.
- D) Virus de Epstein-Barr.**

237. ¿Cuál es la muestra más adecuada para la determinación de carga viral de VIH-1?

- A) Plasma.**
- B) Sudor.
- C) Heces.
- D) Ninguna de las anteriores.

238. El Agar Sabouraud es adecuado para el crecimiento de:

- A) Cocos Gram Positivos.
- B) Enterobacterias.
- C) Parásitos intracelulares.
- D) Levaduras.**
- E) Cocos Gram Negativos

239. La carga viral de un paciente con HIV, ¿en qué unidades se mide?

- A) copias/mL.**
- B) mg/dl.
- C) copias/mmol.

240. El método de Galactomanano se utiliza para la detección de:

- A) Cándida Albicans.
- B) Aspergillus.**
- C) Criptococos.

241. ¿Qué es un micelo?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

A) El conjunto de hifas con sus ramificaciones.

B) Es sinónimo de espora.

C) Un tipo de hongo.

242. Según criterios de clasificación de microorganismos por tamaño, ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el más pequeño?

A) Virus.

B) Bacterias.

C) Hongos.

243. El medio selectivo para el cultivo de hongos es:

A) Agar sangre.

B) Cled.

C) Sabouraud.

244. Dentro de los requisitos de aceptación de muestras microbiológicas, una de las siguientes respuestas es FALSA:

A) La muestra debe de estar perfectamente identificada.

B) El tipo de muestra debe ser adecuada al estudio solicitado.

C) La conservación depende del tipo de muestra y de microorganismos.

D) El transporte de las muestras siempre debe de ser en condiciones refrigeradas.

245. ¿Qué método indirecto se utiliza como método diagnóstico en la detección de HIV?

A) P.C.R.

B) Cultivo viral.

C) Prueba de confirmación: Western Blot.

246. Dentro de la familia de virus retroviridae, ¿a qué género pertenece el VIH?:

A) Lentivirus.

B) Lyssavirus.

C) Orthopoxvirus.

D) Morbillivirus.

247. ¿En el VIH, después de un periodo de incubación de varias semanas o meses que anticuerpo específico es el primero en aparecer?:

A) Anti-gp 160

B) Anti P24

C) Anti-gp 120

D) Gp 41

248. Respecto a las técnicas inmunológicas de diagnóstico de las micosis invasivas, señala la relación incorrecta:

A) Aspergillus – Suero – ELISA.

B) Pneumocystis jirovecii – Suero – ELISA.

C) Cryptococcus – Suero, líquido cefalorraquídeo – ELISA.

D) Cándida – Suero – ELISA.

249. El virus del sarampión pertenece a la familia:

A) Picornaviridae.

B) Paramyxoviridae.

C) Rhabdoviridae.

D) Togaviridae.

250. El orden de las etapas de la replicación viral cuando un virus invade una célula es:

A) Adsorción - Penetración - Decapsidación - Replicación - Ensamblaje - Liberación.

B) Penetración - Adsorción - Replicación - Decapsidación - Ensamblaje - Liberación.

C) Adsorción - Penetración - Decapsidación - Ensamblaje - Replicación - Liberación.

D) Penetración - Adsorción - Decapsidación - Ensamblaje - Replicación - Liberación.

251. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es un patógeno intracelular estricto?

A) Streptococcus pneumoniae.

B) Virus de Epstein-Barr.

C) Candida albicans.

D) Trypanosoma brucei.

252. ¿Cuál de los siguientes virus producen anticuerpos heterófilos?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

- A) Virus de la Hepatitis B.
B) Virus de Epstein-Barr.
C) Virus de Varicela Zóster.
D) Citomegalovirus.

253. ¿Cuál de estos géneros no es desoxirribovirus?

- A) Papilomavirus.
B) Hepadnavirus.
C) Parvovirus.
D) Hepatovirus.

254. Señale la respuesta incorrecta. Una vez producida la infección por VIH tiene lugar la invasión de las llamadas “células diana”, que son:

- A) Monocitos.
B) Macrófagos.
C) Linfocitos T CD4.
D) Linfocitos T CD8.

255. ¿Cuál de las siguientes técnicas es útil para diferenciar *Candida albicans* de otras especies de *Candida*?

- A) Siembra en agar Sabouraud con cicloheximida y cloranfenicol.
B) Observación microscópica con azul de lactofenol.
C) Prueba del tubo germinal o filamentación precoz.
D) Todas son correctas.

256. Los hongos dermatofitos pueden infectar:

- A) Piel.
B) Uñas.
C) Pelo.
D) Todas son correctas.

257. ¿Cuál es el patógeno productor de diarrea más frecuente en niños menores de 2 años?:

- A) Rotavirus.**
B) *Giardia Lamblia*.
C) *Campylobacter jejuni*.
D) *Escherichia coli*

258. ¿Cuál de las siguientes pruebas serológicas es específica para el diagnóstico de aspergilosis invasora?:

- A) Anti-micelio.
B) Galactomanano.
C) Anti-manano.
D) Beta-1,3- D-glucano.

259. Con cuál de las siguientes metodologías NO es posible diagnosticar en el laboratorio una infección vírica:

- A) Microscopía de contraste de fases.**
B) Cultivos celulares.
C) Amplificación de material genético vírico.
D) Métodos de diagnóstico serológicos.

260. Las mutaciones del genoma del SARS-CoV-2 han dado lugar a una serie de variantes en las proteínas codificadas por ellos, denominadas por letras griegas (alfa, delta, beta, gamma y epsilon). La mayoría de estas variantes del SARS-CoV-2 detectadas hasta agosto de 2021 afectan a la proteína:

- A) N
B) T
C) S
D) O

261. ¿Qué proteínas constituyen las dianas habituales de las pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) para el SARS-CoV-2?

- A) N, P, O y RdRp
B) N, E, S y RdRp
C) P, E, T y O
D) E, S, T y N

262. Un resultado positivo en la detección de anticuerpos específicos frente al VIH mediante una técnica de EIA:

- A) Es diagnóstico de infección por VIH.
B) Debe confirmarse por western-blot.
C) Debe confirmarse mediante cuantificación del ARN-VIH-1 en plasma.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

D) Si el ARN-VIH-1 en plasma es negativo, el paciente no es transmisor de la infección.

263. La detección de anticuerpos heterófilos (prueba de Paul Bunnell) resulta muy poco sensible en el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa en

A) Niños menores de 2 años

B) Adolescentes

C) Mayores de 50 años

D) Mayores de 60 años

264. Los métodos combinados (detección de Ag y Ac) para el diagnóstico de VIH tienen como objetivo:

A) Confirmar la infección por VIH

B) No se suelen utilizar

C) Salvar el periodo ventana

D) Valorar el riesgo de transmisión

265. ¿A qué llamamos carga viral de VIH?:

A) Cuantificación de RNA en plasma en paciente infectados por VIH.

B) Cuantificación de ADN en suero en pacientes con VIH.

C) Cuantificación de RNA en suero en pacientes con VIH.

D) Todas son falsas

266. ¿Cuáles son los principales problemas que se generan en la manipulación de células en los cultivos celulares?

A) La acumulación de células apoptóticas.

B) El agotamiento de los nutrientes.

C) La inhibición de la división celular por contacto.

D) Todas son correctas.

267. Un cultivo celular establecido a partir de un tejido u órgano, en muchos casos de un tumor y que se mantiene en cultivo un tiempo ilimitado, se denomina:

A) Línea primaria.

B) Cultivo primario.

C) Línea celular continua.

D) Cultivo inicia

268. ¿Cómo se llama la técnica utilizada para la observación microscópica de hongos filamentosos?

A) Técnica de gota pendiente.

B) Cinta adhesiva.

C) Tinción de Gram.

D) Tinción de Ziehl-Nielsen.

269. En relación con las gastroenteritis infecciosas, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

A) Norovirus se reconoce cada vez con mayor frecuencia como causa de diarrea infecciosa.

B) En el botulismo, al estar originado por una enterotoxina elaborada fuera del hospedador el periodo de incubación es inferior a doce horas.

C) Una posible complicación de la gastroenteritis por Shigella es el síndrome hemolítico-urémico.

D) Los lactantes y niños pequeños son más proclives a sufrir infección por rotavirus, mientras que los niños mayores se infectan con más frecuencia por virus tipo Norwalk.

270. ¿Cuál es la principal enfermedad causada por el virus de Crimea-Congo?

A) Condilomas acuminados.

B) Fiebre hemorrágica.

C) Parotiditis.

D) Meningoencefalitis

271. El medio de cultivo Mycosel(r) para hongos:

A) Se utiliza para la siembra de muestras superficiales.

B) Se utiliza para el aislamiento de hongos en patología respiratorias.

C) Las colonias de levaduras adquieren un color diferente según la especie.

D) Es específico para el aislamiento de hongos del género Aspergillus.

272. Las colonias de levadura de color rojo-anaranjado de aspecto cremoso o rugoso son características de:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

- A) *Cryptococcus neoformans*
- B) *Candida albicans*
- C) *Rhodotorula***
- D) *Aspergillus*

273. Se recibe en el laboratorio una muestra de plasma para cuantificar la carga viral de hepatitis C. Teniendo en cuenta que el genoma de este virus es el ácido ribonucleico (ARN) y que en este momento no se puede realizar la técnica, ¿cómo se debe conservar la muestra?

- A) Si se tarda más de 72 horas en realizar la técnica, conviene congelar como mínimo a -70 °C.**
- B) Refrigerar la muestra de plasma a 5 °C hasta su procesamiento, dado que no se puede congelar.
- C) Congelar la muestra de sangre total a un mínimo de -20 °C, sin ningún tipo de tratamiento.
- D) La muestra de plasma para la detección de VHC debe separarse en menos de 4-6 horas y analizar de inmediato, ya que no se puede conservar la muestra.

274. ¿Cuál de estos virus causa lesiones vesiculares?

- A) Sarampión
- B) Virus del Herpes Simple**
- C) Adenovirus
- D) Parvovirus B19

275. Para la detección en suero del antígeno galactomanano, la técnica empleada es:

- A) Enzimoimmunoanálisis (ELISA)**
- B) Inmunofluorescencia directa
- C) Inmunofluorescencia indirecta
- D) Aglutinación por partículas en látex

276. La prueba de cribado para el VIH más utilizada es:

- A) ELISA**
- B) LIA
- C) PCR
- D) Western Blot

277. ¿Cuál de las siguientes características de los virus es falsa?:

- A) Son parásitos intracelulares
- B) Pueden presentar ciclo de vida libre**
- C) Contienen un solo ácido nucleico
- D) Parasitan animales, vegetales y bacterias

278. ¿Qué muestra se puede utilizar para en aislamientos de virus?:

- A) Secreciones nasales
- B) Heces
- C) Líquido cefalorraquídeo
- D) Todas las anteriores son correctas**

279. ¿Cuál es la respuesta incorrecta?:

- A) El cultivo celular es el método de elección para el diagnóstico de infecciones víricas**
- B) Los virus no crecen en medios artificiales pues son intracelulares estrictos
- C) La detección de Ac tipo IgG e IgM es muy útil en algunas infecciones víricas
- D) Las técnicas de amplificación genómica son muy útiles para el diagnóstico de algunas infecciones víricas

280. ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa?:

- A) Tinción de Gram en sangre----diagnóstico de paludismo (malaria)**
- B) Azul de lactofenol---hongo filamentoso
- C) Metenamina de plata---*Pneumocystis jirovecii*
- D) Examen en fresco---- *Trichomonas vaginalis* en exudado vaginal

281. Indica la respuesta correcta en relación a la contaminación de los cultivos celulares.

- A) El área de trabajo para la realización de cultivos celulares no necesariamente tiene que estar aislada del resto de laboratorio.
- B) Las micobacterias suelen infectar las líneas celulares continuas.
- C) Una solución a largo plazo para evitar la contaminación bacteriana es la adición de antibióticos, ya que no provoca problemas de viabilidad celular.
- D) Ninguna es correcta.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 14.2 y 14.3: Virus y hongos

282. ¿Cuáles son los principales virus de relevancia clínica de la familia Herpesviridae que podemos determinar en el laboratorio de Microbiología?

A) Herpes simple, varicela - zóster, citomegalovirus y Epstein - Barr.

B) Herpes simple, papiloma humano, parvovirus y Epstein - Barr.

C) Herpes simple, viruela, citomegalovirus y hepatitis B.

D) Herpes simple, herpesvirus humano, rotavirus y coronavirus.

283. ¿Qué tinción se emplea para la detección de la cápsula de *Cryptococcus neoformans* en líquido cefalorraquídeo (LCR)?

A) Blanco de calcoflúor.

B) Azul algodón de lactofenol.

C) Tinta china.

D) Gomori - Grocott modificada.

284. El agente etiológico de la tiña negra es:

A) *Sporothrix schenckii*.

B) *Madurella mycetomatis*.

C) *Hortaea werneckii*.

D) *Rhizopus*.

285. La piedra blanca es una micosis superficial causada por diversos hongos levaduriformes del género:

A) *Trichosporon*.

B) *Candida*.

C) *Lichtheimia*.

D) *Fusarium*.

286. ¿Qué micosis superficial es la que está causada por diversos hongos levaduriformes como por ejemplo *Malassezia furfur*?:

A) Tiña de la barba.

B) Piedra negra.

C) Feohifomicosis.

D) Pitiriasis versicolor.

287. Los virus de familia Picornaviridae son virus ARN.

Esta familia está formada por los siguientes géneros excepto:

A) Rinovirus.

B) Poliomavirus.

C) Hepatovirus.

D) Enterovirus.

288. ¿Cuál de los siguientes virus no es diarreico o gastrointestinal?:

A) Calicivirus.

B) Astrovirus.

C) Virus JC.

D) Rotavirus.

289. Los retrovirus comprenden una gran variedad de virus que inducen habitualmente neoplasias en sus huéspedes naturales. El material genético de estos virus está compuesto por:

A) ARN sin envoltura.

B) ADN y ARN.

C) ARN con envoltura.

D) ADN circular.

290. Los virus de las familias Ortomixoviridae y Paramixoviridae se distinguen de otros virus por presentar las glucoproteínas de membrana:

A) Fosfatasa y nucleasa.

B) Elastasa y transcriptasa.

C) Nucleasa y transcriptasa.

D) Neuraminidasa y hemaglutinina.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases