

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.1: Drogas de abuso

1. ¿Cuál de las siguientes sustancias no se considera un estimulante del Sistema Nervioso Central?:
A) Anfetaminas.
B) Nicotina.
C) Opio.
D) Tricíclicos.
2. La vida media de la cocaína en sangre es de:
A) 1 día.
B) 2-5 días.
C) 1-2 horas.
D) Una semana.
3. El consumo de tabaco altera el análisis sanguíneo provocando:
A) Aumento de lactato.
B) Disminución de la carboxihemoglobina.
C) Disminución en el conteo de leucocitos.
D) Aumento de la albúmina.
4. El problema común en el método de detección de los estimulantes es:
A) Es la obtención de falsos positivos por la posibilidad de reacciones cruzadas.
B) Es que sea necesaria la detección de un número elevado de ellos en las muestras.
C) Se metabolizan muy rápido a compuestos activos.
D) Las muestras son sangre, orina y cabellos.
5. De las siguientes drogas, ¿cuál no pertenece al tipo de los opiáceos?
A) Heroína.
B) Codeína.
C) Mescalina.
D) Metadona.
6. La muestra biológica más utilizada en el análisis de drogas de abuso es:
A) El suero.
B) El plasma.
C) La orina.
D) La saliva.
7. En cuanto al modelo de informe de laboratorio para la determinación de drogas de abuso por inmunoanálisis, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
A) Se debe informar mediante resultados cuantitativos
B) No se debe informar el método utilizado
C) Es conveniente adjuntar qué sustancias pueden dar resultado positivo mediante reacción cruzada
D) No se debe informar del valor discriminante
8. Dentro de las principales drogas de abuso están:
A) En los alucinógenos: cocaína.
B) En los opiáceos: codeína.
C) En los estimulantes: alcohol.
D) En las depresoras: tabaco.
9. La vía de administración de las anfetaminas es:
A) Oral.
B) Oral, inyección e inhalación.
C) Fumada y oral.
D) Ninguna es correcta.
10. En cuanto a la terminología relativa a drogas de abuso, se define como deterioro acusado y progresivo de la memoria para los hechos recientes a:
A) Consumo perjudicial.
B) Trastorno psicótico.
C) Síndrome de abstinencia.
D) Síndrome amnésico.
11. ¿Cuál es el mejor método para confirmar la presencia de metabolitos de heroína en orina?:
A) Inmunoanálisis.
B) Cromatografía en capa fina.
C) Cromatografía de gases y espectrofotometría de masas.
D) Prueba de color.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.1: Drogas de abuso

12. Los consumidores crónicos de cannabis pueden dar positivo en su orina hasta:
- A) Dos días después de su último consumo.
 - B) Cinco días después de su último consumo.
 - C) Ocho días después de su último consumo.
 - D) Cuatro semanas después de su último consumo.
13. La solicitud de la determinación de drogas de abuso en orina mediante inmunoanálisis en el contexto de la urgencia médica se realiza para:
- A) Confirmar una impresión diagnóstica
 - B) Descartar su presencia en orina
 - C) Conocer el grado de intoxicación del paciente,
 - D) Confirmar su presencia en orina
14. En la determinación de drogas de abuso, la identificación del paciente pertenece a la fase...
- A) Post-analítica.
 - B) Analítica.
 - C) Pre-analítica.
 - D) Ninguna es correcta.
15. ¿Cuál de estas drogas es un depresor del Sistema Nervioso Central (SNC)?:
- A) Alcohol etílico.
 - B) Marihuana.
 - C) Mescalina.
 - D) Ninguna es correcta.
16. ¿Qué droga de abuso de las siguientes puede ser detectada en orina durante un mayor período de tiempo?
- A) Heroína
 - B) Morfina
 - C) Cocaína
 - D) Cánnabis (THC)
17. Los metabolitos de los opiáceos se pueden detectar en orina durante:
- A) 3 días.
 - B) 5 días.
 - C) 7 días.
 - D) Sólo el día de la ingesta.
18. En el análisis de sustancias de abuso en orina mediante métodos de inmunoanálisis, la presencia de efedrina puede ocasionar un resultado falso positivo por reacción cruzada con:
- A) Cocaína.
 - B) Anfetamina.
 - C) Benzodiacepinas.
 - D) Opiáceos
19. ¿Cuál es la muestra de elección por razones técnicas y prácticas en el screening de las drogas de abuso?:
- A) Sangre.
 - B) Orina.
 - C) Saliva.
 - D) Heces.
20. ¿Qué drogas de abuso se determinan en el laboratorio?
- A) Benzodiacepinas.
 - B) Cocaína.
 - C) Opiáceos.
 - D) Todas son correctas.
21. Qué tipo de muestra es más usada para la determinación de las drogas y sus metabolitos
- A) Orina.
 - B) Plasma.
 - C) Todas son falsas.
 - D) Suero.
22. ¿Cuál es la muestra de elección por razones técnicas y prácticas en el cribado de las drogas de abuso en el laboratorio clínico?
- A) Sangre.
 - B) Orina.
 - C) Saliva.
 - D) Heces.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.1: Drogas de abuso

23. Los resultados de un análisis confirmatorio de drogas de abuso nos dan información de:
- A) Informan de manera cualitativa (positivo o negativo) acerca de la droga detectada.
 - B) Informan de manera cuantitativa acerca de la droga detectada y sus metabolitos.
 - C) Informan de manera cualitativa y cuantitativa acerca de la droga detectada y sus metabolitos.**
 - D) Informan de los factores biológicos relacionados con el genotipo.
24. ¿Cuál es la muestra de elección por razones técnicas y prácticas en el cribado de las drogas de abuso?:
- A) Sangre.
 - B) Orina.**
 - C) Saliva.
 - D) Heces.
25. La concentración de etanol en suero se puede determinar por métodos:
- A) Enzimáticos.
 - B) Cromatografía de gases.
 - C) Métodos acoplados enzimáticos / oxidación electroquímica.
 - D) Todas son correctas.**
26. ¿Qué método enzimático se utiliza para la determinación del etanol?:
- A) Alcohol oxidasa.
 - B) Aldehído oxidasa.
 - C) Alcohol deshidrogenasa.**
 - D) Aldehído deshidrogenasa.
27. Ante una sospecha de adulteración de la muestra de orina, para la determinación de drogas de abuso, ¿qué parámetro nos indicaría que la muestra NO es orina?:
- A) Una creatinina en orina inferior a 5 mg/dl.**
 - B) Un PH entre 4,5 y 8.
 - C) Una creatinina en orina superior a 20 mg/dl.
 - D) Un color de la orina amarillo ocre.
28. La muestra biológica más utilizada para la detección de drogas de abuso por el método de inmunoanálisis es:
- A) Plasma.
 - B) Orina.**
 - C) Suero.
 - D) Saliva.
29. En un test inmunocromatográfico competitivo para la determinación cualitativa de metabolitos de drogas en orina, la aparición de una línea coloreada en la región del test y del área de control, indica:
- A) Test positivo.
 - B) Test negativo.**
 - C) Test no válido.
 - D) Existencia de adulterantes en la orina.
30. ¿Cuál de estas drogas es un estimulador del Sistema Nervioso Central (SNC)?
- A) Benzodiazepinas.
 - B) Alcohol.
 - C) Anfetaminas.**
 - D) Psilobicina.
31. ¿Cuál de los siguientes métodos NO es habitualmente utilizado para la confirmación de la detección de drogas de abuso?
- A) GC-FID (cromatografía de gases- detector de ionización por llama).
 - B) GC-MS (cromatografía de gases- espectrometría de masas).
 - C) HPLC-UV (cromatografía líquida de alta resolución- espectrofotometría ultravioleta).
 - D) FAAS (Espectrofotometría de absorción atómica de llama).**
32. En la determinación de la dosis letal media ¿sobre qué porcentaje de la población de prueba se debe producir el efecto evaluado?
- A) 5 %de los individuos a los que se administra.
 - B) 50% de los individuos a los que se administra.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.1: Drogas de abuso

C) 95% de los individuos a los que se administra.

D) Ninguno de ellos.

33. En el cribado de sustancia de abuso, solo una afirmación es correcta:

A) La inmunocromatografía en capa fina presenta una baja sensibilidad para minimizar los falsos negativos.

B) Se puede utilizar una inmunocromatografía en capa fina.

C) Los test de enzimoimmunoanálisis usados para tóxicos son altamente específicos lo que imposibilita la aparición de falsos positivos.

D) Es necesario un detector de gases acoplado a la espectrofotometría de masas para confirmar resultados negativos.

34. Un resultado positivo en una prueba de cribado de drogas de abuso por métodos inmunocromatográficos:

A) Indica que la concentración de la sustancia de abuso es superior al punto de corte o cutt off de la prueba

B) Se observará una línea continua en la ventana C de control solamente

C) Se observará una línea continua en la ventana T de muestra y una línea continua en la ventana C de control

D) A y B son ciertas

35. En cuanto al cribado de Drogas de Abuso en orina, es cierto que:

A) Los métodos de cribado (inmunoanálisis) deben ofrecer una alta especificidad analítica.

B) Los métodos de cribado (inmunoanálisis) deben ofrecer una alta sensibilidad analítica.

C) El intervalo de tiempo de detección de estas sustancias es ilimitado desde que se produce el consumo.

D) Los resultados obtenidos por métodos de cribado se pueden considerar definitivos y, por tanto, diagnósticos.

36. ¿Cuál de los siguientes parámetros relacionados con el metabolismo o la farmacocinética del etanol presenta un mayor interés médico legal como prueba ante los tribunales de justicia?

A) Concentración máxima de alcohol en sangre.

B) Área bajo la curva de alcoholemia.

C) Coeficiente de eliminación β .

D) Ninguno de los anteriores.

37. Mujer de 74 años, que es llevada a Urgencias por su hijo, que refiere haberla encontrado en casa en estado de sedación, somnolienta que apenas responde a estímulos, falta de coordinación motora e incapacidad para hablar. Se le pregunta a su hijo sobre la medicación que toma su madre y refiere tratamiento para el colesterol, la tensión arterial y que, tras fallecimiento de su padre, toma algo para la ansiedad y dormir mejor. Se le toma una muestra de orina y sangre, solicitándose bioquímica básica en suero y un test de drogas. ¿Qué método básico es el más ampliamente utilizado para screening de drogas de abuso en orina, en laboratorio de urgencias?

A) Cromatografía de gases-Espectrometría de masas (GC-MS).

B) Gasometría.

C) Inmunoensayo múltiple enzimático (EMIT).

D) Inmunocromatografía.

38. Señale algún inconveniente en el uso de técnicas de screening de drogas en orina:

A) Facilidad de ejecución.

B) Rapidez de resultados.

C) Buena relación coste-efectividad.

D) Reacciones cruzadas (falsos positivos).

39. Si se obtiene un resultado positivo para una droga en un test de screening de orina, basado en la competición del antígeno "marcado" y "no marcado" por el sitio de unión a un anticuerpo específico, ¿qué observamos?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 21.1: Drogas de abuso

A) Una línea continua en la ventana T de muestra y una línea continua en la ventana C de control.

B) Una sola línea continua en la ventana C de control.

C) No aparece ninguna línea en el test.

D) Una línea discontinua en la ventana C de control.

40. La definición del cut-off de una técnica analítica es:

A) El valor del control alto.

B) El valor del control bajo.

C) El punto de corte (concentración de la droga en la muestra) a partir del cual se considera el resultado positivo.

D) El método analítico del autoanalizador.

41. El consumo continuado de drogas puede llegar a producir:

A) Daños orgánicos y cerebrales.

B) Dependencia física y psicológica.

C) Conductas compulsivas, agresivas o violentas.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

42. La solicitud de la determinación de drogas de abuso en orina mediante inmunoanálisis en el contexto de urgencia médica tiene como finalidad:

A) Confirmar su presencia en orina.

B) Descartar su presencia en orina.

C) Determinar el grado de intoxicación del paciente.

D) No se debe utilizar esta prueba en urgencias.

43. El periodo de tiempo en el que es detectable la presencia en orina de una droga de abuso tras su consumo se puede definir como:

A) Sensibilidad de la prueba

B) Especificidad de la prueba

C) Ventana de positividad

D) Cribado

44. Indique cuál de los siguientes agentes farmacológicos puede ser causa de resultados falsos positivos para anfetaminas en el cribado de drogas de abuso en orina:

A) Clomipramina.

B) Amoxicilina.

C) Ibuprofeno.

D) Ranitidina.

45. ¿Qué métodos en análisis presuntivos se usan para detección de benzodiazepinas?

A) GC-MS

B) LC-MS/MS

C) Inmunoanálisis o HPLC

D) GC-MS o LC-MS/MS



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases