

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

1. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales es una enzima?:

- A) Antígeno carcinoma embrionario.
- B) Calcitonina.
- C) Gastrina.

D) Fosfatasa ácida prostática.

2. Entre los antígenos oncofetales se encuentran:

A) Citoquinas.

B) CEA.

C) BHCG.

D) CA125.

3. La AFP es un antígeno oncofetal que:

A) Aumenta en casos de hepatoma maligno.

B) Disminuye en carcinoma medular.

C) Aumenta en cáncer de próstata.

D) Disminuye en el coriocarcinoma.

4. Los oncogenes son:

A) Genes normales que se encuentran en todas las células.

B) Proteínas tumorales.

C) Genes normales que se encuentran en células tumorales.

D) Genes que codifican proteínas anómalas en la célula tumoral.

5. De los siguientes marcadores tumorales, ¿cuál no es una enzima?:

A) PAP.

B) NSE.

C) β -HCG.

D) PHI.

6. En el estudio del cáncer de hígado se emplean:

A) AFP y PSA.

B) CEA y NSE.

C) AFP y CEA.

D) NSE y PSA.

7. La fosfatasa ácida es un marcador asociado al:

A) Cáncer de próstata.

B) Cáncer de páncreas.

C) Adenocarcinoma.

D) Linfoma.

8. ¿Qué marcador se encuentra asociado a tumores de mama?:

A) CA 15.3

B) CA 125

C) CA 19.9

D) AFT

9. El marcador de elección en tumores epiteliales de ovario es:

A) CA 15.3

B) CA 125

C) CA 19.9

D) SCC

10. Una mujer de 50 años tiene un bulto en la glándula tiroides. Una punción con aguja fina reveló que era un carcinoma medular. ¿Qué marcador tumoral debería estar aumentado?:

A) Alfa-fetoproteína.

B) CA 125.

C) CA 15.3.

D) Calcitonina.

11. ¿Cuál de estas características es propia de los marcadores tumorales?

A) Alta especificidad diagnóstica.

B) Baja sensibilidad diagnóstica.

C) Son útiles en pacientes con síntomas inespecíficos.

D) No se elevan en condiciones benignas del paciente.

12. ¿Cuál de estos marcadores es el más empleado en el cáncer de mama?

A) CEA.

B) CA54.9.

C) CA15.3.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

D) CA M26.

13.¿Cuál de los siguientes marcadores son antígenos oncofetales?

- A) PAP y NSE
- B) PTH y ADH
- C) AFP y CEA**
- D) PSA y CA 125

14.En relación al antígeno CA 19.9. Señale la afirmación incorrecta:

- A) Se encuentra presente en varios tejidos fetales.
- B) Estará disminuida en hepatopatías.**
- C) Aumenta en pancreatitis.
- D) Sus niveles están relacionados con la presencia de ictericia obstructiva.

15.En un estudio de cáncer de mama ¿Qué emplearíamos?:

- A) Receptores de estrógenos y progesterona**
- B) CA 125
- C) Las respuestas A y B son correctas
- D) Ninguna es correcta

16.Ante un paciente con el grupo sanguíneo Lewis negativo, y con sospecha de un cáncer de páncreas, ¿qué marcadores tumorales solicitaríamos?:

- A) CEA y CA19.9
- B) CEA y CA 50**
- C) CEA y CA 125
- D) CEA y PSA

17.¿Qué marcadores tumorales se solicitan principalmente para el seguimiento de cáncer de estómago?

- A) SCC, AFP
- B) CA 15.3, PSA
- C) CA125, SCC
- D) CA19.9, CA72.4, CEA**

18.¿Cuál de los siguientes es un marcador tumoral proteico?

- A) Glucosiltransferasa.
- B) Ferritina.**
- C) ADH.
- D) Lisozima.

19.Un marcador terapéutico es:

- A) Aquel que nos ofrece una información precisa sobre la agresividad de las células tumorales.
- B) Aquel que nos ofrece información sobre la respuesta de las células tumorales a los diferentes tratamientos.**
- C) Aquel que contiene sustancias originadas por las alteraciones genómicas de las células tumorales.
- D) Aquel que nos ofrece información sobre la evolución de la enfermedad o la respuesta tumoral a un determinado tratamiento.

20.Señale cuál de los siguientes marcadores tumorales es una enzima:

- A) Calcitonina.
- B) Gastrina.
- C) Fosfatasa ácida prostática.**
- D) Antígeno carcinoembrionario.

21.Señale de entre los siguientes marcadores cuál está relacionado principalmente con el cáncer de mama:

- A) CA15-3**
- B) CA 125
- C) CEA
- D) PSA

22.La riqueza en hematíes de uno de los siguientes marcadores tumorales, puede originar falso positivo por hemólisis señálelo:

- A) CEA (antígeno carcinoembrionario).
- B) AFP (alfafetoproteína).
- C) NSE (enolasa neuronal específica).**
- D) Ninguno de los anteriores.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

23. ¿Cuál de los siguientes parámetros utilizados como marcadores, no es derivado del tumor sino asociado al mismo?

- A) Fosfatasa alcalina.
- B) Ferritina.
- C) CEA 19.9.
- D) Alfafetoproteína.

24. Concentraciones elevadas de los siguientes marcadores tumorales en suero son de muy elevada especificidad con el tumor asociado:

- A) Calcitonina y cáncer medular de tiroides.
- B) Antígeno carcinoembrionario (CEA) y cáncer hepático.
- C) Alfafetoproteína (AFP) y carcinoma renal.
- D) Ninguno de los anteriores.

25. La proteína S100 (deriva su nombre por ser soluble en sulfato amónico) y utilizada como marcador tumoral, es útil en:

- A) Seguimiento del tumor de piel melanoma maligno.
- B) Tumores de páncreas.
- C) Tumores de hígado.
- D) En ninguno de los tumores anteriores.

26. La asociación de los marcadores CA 125 y HE4 (proteína epididimal humana 4) mejora la sensibilidad diagnóstica en una de las siguientes neoplasias. Señálela:

- A) Pulmón.
- B) Colon.
- C) Ovario.
- D) Hígado.

27. Señale la neoplasia donde es de utilidad la determinación del marcador tumoral antígeno carbohidratado (CA19.9):

- A) Tumor testicular.
- B) Carcinoma de tiroides.
- C) Adenocarcinoma de páncreas.
- D) Tumor suprarrenal.

28. En el hallazgo de una concentración "superior" a determinado nivel de normalidad de un marcador tumoral, indique lo cierto:

- A) Puede indicar la existencia de un cáncer.
- B) No es suficiente para diagnosticar un cáncer.
- C) Se reduce a sospechar el diagnóstico o valorar la evolución de un tumor.
- D) A, B, y C son ciertas.

29. Señale la principal indicación de la combinación de los siguientes marcadores tumorales Alfafetoproteína junto a la Beta HGC (Hormona Gonadotropina Coriónica):

- A) Carcinoma de tiroides.
- B) Carcinoma colorrectal.
- C) Tumores testiculares no seminomas.
- D) Melanoma.

30. Señale la principal indicación del siguiente marcador tumoral antígeno carbohidratado (CA 15.3):

- A) Tumor de testículo.
- B) Carcinoma de mama.
- C) Carcinoma de hígado.
- D) Tumor óseo.

31. El HE-4 se utiliza en:

- A) Valoración función renal
- B) Carcinomas pulmonares
- C) Carcinomas de ovario
- D) En todas ellas

32. Para mejorar la eficacia del diagnóstico del carcinoma de ovario, se ha propuesto el algoritmo ROMA, utilizando los marcadores:

- A) CA 125 y HE4
- B) CA125 y NSE.
- C) CA 125 y ProGRP
- D) CA 125 y el análisis de regresión logística

33. Un paciente presenta un valor de CA 19.9 de 156 U/mL, a los quince días el valor fue 111 U/mL, al

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

mes 165 U/mL y a los 3 meses 158 U/mL. En este período de tiempo, el paciente no recibe ningún tratamiento específico. Si los valores normales del CA 19.9 son inferiores a 37 U/mL, qué sugieren los resultados anteriores:

- A) Probablemente el paciente tiene una patología maligna
- B) Probablemente el paciente está sano
- C) Probablemente el paciente tiene una patología no neoplásica**
- D) Probablemente el paciente tiene una recidiva tumoral

34. De los siguientes, ¿cuál es el mejor marcador para un paciente con síndrome carcinoide?:

- A) Alfa-fetoproteína en suero
- B) Serotonina en orina
- C) Ácido 5-hidroxi-indol-acético en orina**
- D) Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT) en suero

35. ¿Qué marcador no incluiría en una estrategia diagnóstica de cáncer de pulmón?

- A) Enolasa neuronal específica.
- B) SCC (antígeno asociado al carcinoma de células escamosas).
- C) Alfa-fetoproteína.**
- D) Precursor del péptido liberador de la gastrina (proGRP).

36. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales presenta una mayor eficacia diagnóstica en los enfermos con cáncer de páncreas?

- A) Antígeno carcinoembrionario
- B) CA 19.9**
- C) CA 50
- D) CA 195

37. El marcador tumoral CYFRA 21.1 pertenece a la familia de:

- A) Las mucinas
- B) Las oncoproteínas
- C) Las citoqueratinas**
- D) Los antígenos oncofetales

38. La gonadotropina coriónica se relaciona con los tumores de:

- A) Testículo
- B) Enfermedad trofoblástica
- C) Carcinoma ovárico
- D) Todas las anteriores**

39. Un feocromocitoma es:

- A) Un tumor productor de FSH
- B) Un tumor productor de TSH
- C) Un tumor productor de catecolaminas**
- D) Un tumor productor de estrógenos

40. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales utilizados en el cáncer primitivo de hígado presenta una mayor eficacia clínica en la detección temprana del hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis hepática?

- A) CEA
- B) AFP**
- C) CA 19.9
- D) CA 125

41. Uno de los objetivos de las proteínas codificadas por oncogenes son las proteínas de matriz nuclear (NMP). Destaquemos la NMP22 en el estudio del cáncer de:

- A) Pulmón (células escamosas).
- B) Pulmón (de células grandes).
- C) Pulmón (de células pequeñas).
- D) Vejiga.**

42. ¿Cuál de estos marcadores es el más empleado en el cáncer de mama?:

- A) CEA.
- B) CA54.9.
- C) CA15.3.**
- D) CA M26.

43. Una mujer de 50 años tiene un bulto en la glándula tiroides. Una punción con aguja fina reveló que era

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

un carcinoma medular. ¿Qué marcador tumoral debería estar aumentado?

- A) Alfa-fetoproteína.
- B) CA 125.
- C) CA 15.3.
- D) Calcitonina.

44. Según la clasificación tradicional de los marcadores tumorales, señale cuál de los siguientes es una mucina:

- A) PSA
- B) CA 15.3
- C) CEA
- D) Beta-Hcg

45. En relación a las estrategias adecuadas para optimizar el uso de los marcadores tumorales. Señale la correcta:

- A) El hallazgo de concentraciones elevadas de cualquier marcador, de forma aislada, tiene valor limitado.
- B) Para mejorar la especificidad es necesario descartar las patologías benignas que puedan incrementar el marcador tumoral.
- C) Hay que considerar las posibles interferencias técnicas.
- D) Todas son correctas.

46. El marcador tumoral de elección para el cáncer hepatocelular es:

- A) Alfa-fetoproteína (AFP)
- B) Antígeno carbohidrato CA 19.9
- C) Antígeno carcinoembrionario (CEA)
- D) Antígeno carbohidrato CA 125

47. En relación al estudio secuencial de los marcadores tumorales, señale la respuesta FALSA:

- A) Se deben realizar 2 o 3 determinaciones seriadas.
- B) El intervalo entre determinaciones dependerá de la semivida plasmática del marcador, generalmente entre 15 y 20 días.

C) Un incremento entre un 5-10% por encima del rango de referencia del marcador ya se considera significativo.

D) Si los valores séricos no se modifican o tienden a descender, la causa probablemente no será tumor.

48. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales NO se utiliza en el cáncer de mama?:

- A) CEA
- B) HER-2/neu
- C) CA15.3
- D) SCC

49. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales presenta una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico y evolución de los tumores trofoblásticos gestacionales?:

- A) Fracción β de la hormona gonadotropina coriónica.
- B) Antígeno carcinoembrionario.
- C) CA 15.3.
- D) α -fetoproteína.

50. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales utilizados en el cáncer de mama NO es un antígeno mucínico?

- A) CA 549.
- B) CEA.
- C) CA 15.3.
- D) Todos lo son.

51. El marcador tumoral que muestra una mayor sensibilidad en el diagnóstico de carcinomas epiteliales de ovario es:

- A) CEA.
- B) CA 125.
- C) Antígeno polipeptídico tisular.
- D) Ninguno de los anteriores.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

52.¿Cuál de los siguientes parámetros bioquímicos empleados en el diagnóstico del carcinoma de próstata se encuentra generalmente descendido en los pacientes con cáncer frente a los que presentan hiperplasia benigna de próstata o en individuos sanos?:

- A) Densidad de antígeno prostático específico.
- B) Antígeno prostático específico total.
- C) Fracción de antígeno prostático específico libre/Antígeno prostático específico total.
- D) Todos los anteriores aumentan en el cáncer de próstata.

53.¿Entre las características deseables que debe poseer un marcador tumoral bioquímico, cuál es la que cumplen todos los que tienen una amplia utilización clínica?

- A) Sus niveles deben evolucionar de forma paralela a la progresión de la enfermedad.
- B) Debe ser producido únicamente por el tejido tumoral del órgano afectado.
- C) Debe ser específico de un tipo de tumor.
- D) No se debe detectar en patologías no tumorales

54.¿Qué marcadores se solicitan para el diagnóstico de cáncer de estómago?

- A) CEA 19,9- CA 72,4- CEA
- B) SCC
- C) CEA 15,3
- D) CEA 72,2

55.El marcador tumoral más utilizado para el diagnóstico de cáncer prostático es:

- A) TPA.
- B) AFP.
- C) PSA.
- D) CEA 15,3.

56.El marcador tumoral CA15.3 se usa para el seguimiento de tumores de:

- A) Estómago.
- B) Pulmón.

C) Testículo.

D) Mama.

57.¿Cuál de las siguientes determinaciones no es un marcador tumoral?

- A) PSA
- B) AFP
- C) CEA
- D) FSH

58.Cuando hablamos del TPA, nos referimos a:

- A) El método de referencia del colesterol
- B) Un marcador tumoral
- C) El tiempo de protrombina ampliado
- D) Un antiepiléptico de nueva generación

59.¿Cuál de las siguientes determinaciones ha demostrado mayor utilidad en el screening universal del cáncer colorrectal?

- A) CA19.9
- B) CEA
- C) Sangre oculta en heces
- D) CYFRA21

60.La concentración elevada de alfa-fetoproteína en suero nos sugiere una de las siguientes patologías:

- A) Seminoma de testículo
- B) Hepatitis
- C) Cirrosis
- D) Hepatocarcinoma

61.¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales es más sugestivo de cáncer de páncreas?:

- A) PSA
- B) CA 125
- C) CA 19.9
- D) CA 15.3

62.¿En cuál de las siguientes situaciones se puede producir una elevación de CEA (Ag carcinoembrionario) sin que exista patología tumoral?:

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

- A) Insuficiencia renal
B) Paciente fumador
C) Hepatopatía
D) En todas las situaciones anteriores
63. ¿Qué prueba se emplea en la detección precoz del cáncer de colon?
A) Sangre oculta en heces
B) Cuerpos reductores
C) Determinación de leucocitos en sangre
D) Calprotectina
64. ¿Qué marcador tiene mayor sensibilidad y especificidad que el CA125 en el diagnóstico del cáncer de ovario?:
A) AFP.
B) CEA.
C) HE4.
D) CA 15.3.
65. Sobre el marcador tumoral CA 15-3 es cierto que:
A) Es un marcador usado en el diagnóstico y seguimiento de tumores hepatobiliares.
B) Es un marcador asociado a tumores de ovario.
C) Es un marcador usado en el seguimiento de tumores de mama.
D) Su aumento es indicativo de procesos tumorales de próstata.
- 66.Cuál de estas premisas es verdadera:
A) La mayoría de los marcadores tumorales tienen sensibilidad y especificidad suficiente para la detección precoz del cáncer.
B) Algunos marcadores tumorales pueden emplearse en el diagnóstico precoz en grupos de alto riesgo.
C) No es necesaria para la correcta utilización, la valoración conjunta de los datos clínicos.
D) No existen diferencias analíticas intercentros en los valores de los marcadores tumorales.
67. El CA-19.9 es el marcador tumoral de elección en:
A) Trastornos gastrointestinales benignos
B) Carcinomas pancreáticos
C) Neoplasia ovárica
D) Tumores bronco pulmonares
- 68.Cuál de los siguientes marcadores tumorales es una enzima:
A) CA-15.3
B) Calcitonina
C) Enolasa neuroespecífica (NSE)
D) CA-12.5
69. El cáncer colorrectal es la tercera neoplasia en frecuencia, aproximadamente el 40-50% de dichas neoplasias recidivan, indique el marcador tumoral en el primer signo de recidiva:
A) Antígeno carbohidrato 125 (CA125)
B) Antígeno carcinoembrionario (CEA)
C) Antígeno carbohidrato 15.3 (CA15.3)
D) Enolasa neuronal específica (NSE)
70. ¿Cuál es el marcador tumoral de elección en los carcinomas ováricos?:
A) AFP
B) CA125
C) B-HCG
D) CEA
71. ¿Cómo denominamos el producto molecular metabolizado y secretado por tejido neoplásico que sea susceptible de ser cuantificado en células o fluidos corporales?
A) Enzima
B) Marcador tumoral
C) Catalizador
D) Marcador fluorescente
72. El marcador tumoral 15.3 se utiliza en el seguimiento de los tumores de:
A) Hígado.
B) Pulmón.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

C) Mama.

D) Testículo.

73. En los tumores germinales testiculares no seminomatosos, los marcadores tumorales de elección son:

A) AFP y BETA-HCG

B) AFP y testosterona

C) B-HCG y testosterona

D) LDH y HCG total

74. La medición de la Beta 2 microglobulina en sangre es de utilidad en alguno de los siguientes tumores:

A) Tumores de mama.

B) Leucemias.

C) Mieloma múltiple.

D) B y C son ciertos.

75. Un marcador relativamente específico del cáncer microcítico de pulmón es:

A) CA 18.9

B) Calcitonina.

C) Enolasa neuronal específica.

D) CA 72.4

76. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, respecto a los factores carcinogénicos?

A) El tabaco es la causa del 90% de los cánceres de pulmón.

B) Existen mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de desarrollo de neoplasias malignas.

C) Los virus no son factores carcinogénicos.

D) El alcohol se asocia a cáncer de cavidad oral y faringe.

77. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales se utiliza en la monitorización de carcinomas de ovario y mama?

A) CA 15-3.

B) HCG.

C) PSA.

D) CA 19.9.

78. El marcador tumoral S100 se utiliza para el diagnóstico, monitorización y pronóstico de:

A) Carcinoma de pulmón.

B) Carcinoma de mama.

C) Melanoma maligno.

D) Carcinoma hepatocelular.

79. El PSA se puede encontrar aumentado, en todos los siguientes procesos, excepto:

A) Carcinoma de vejiga.

B) Carcinoma de próstata.

C) Prostatitis.

D) Hipertrofia benigna de próstata.

80. El HE4:

A) Es un marcador tumoral de cáncer de ovario.

B) Es un marcador tumoral de cáncer de mama metastásico.

C) Es un marcador de cáncer de pulmón de células pequeñas.

D) Es un marcador que nos orienta a la hora de realizar una segunda biopsia prostática.

81. La cromogranina A:

A) Es un marcador de infección digestiva.

B) Es un marcador nutricional.

C) Es un marcador tumoral.

D) Es una proteína de fase aguda.

82. ¿Cuál de los siguientes marcadores es de utilidad en el cáncer de Pulmón?:

A) proGRP.

B) HE4.

C) BRAF.

D) HCG.

83. El índice ROMA es de utilidad en el cáncer de:

A) Próstata.

B) Pulmón.

C) Cérvix.

D) Ovario.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

84. ¿Cuál de estos marcadores tumorales pertenece al grupo de las citoqueratinas?:

- A) Antígeno del carcinoma de células escamosas (SCC).
- B) Antígeno polipeptídico tisular (TPA).**
- C) Enolasa neuroespecífica (NSE).
- D) Antígeno carbohidratado 19.9 (CA 19.9).

85. La utilidad más aceptada de los Marcadores Tumorales es:

- A) Diagnóstico de la Neoplasia.
- B) Seguimiento, monitorización terapéutica y posibles recidivas de los pacientes.**
- C) Detección de metástasis.
- D) Son útiles como prueba de cribado en la población general.

86. El marcador tumoral más útil para el seguimiento de cáncer prostático es:

- A) TPA
- B) AFP
- C) PSA**
- D) CEA 15.3

87. El marcador CA125 se utiliza para el seguimiento de tumores de:

- A) Tiroides
- B) Testículo
- C) Ovario**
- D) Mama

88. Del marcador tumoral CA 15.3, es cierto que:

- A) Es indicativo de procesos tumorales de próstata.
- B) Es usado en el diagnóstico y seguimiento de tumores hepatobiliares.
- C) Es un marcador asociado al cáncer de ovario.
- D) Es el marcador usado para el seguimiento de cáncer de mama.**

89. ¿Cuándo está indicado realizar la prueba PSAL?

- A) Si la PAST es > 10 ng/ml
- B) Si la PAST es < 4 ng/ml
- C) Si la PAST está entre 4-10 ng/ml**

D) Se realiza conjuntamente con la PSAT

90. ¿Cuál de los siguientes marcadores es un oligosacárido?

- A) Ca 15.3.
- B) Ca 12.5.
- C) Ca 19.9.**
- D) PSA.

91. De las moléculas que a continuación se citan, señale cuáles se utilizan, están ya aceptadas, o bien se encuentran bajo investigación para su uso como marcadores tumorales:

- A) Antígeno asociado a carcinoma escamoso (SCC).
- B) Ferritina.
- C) Ácidos nucleicos libres.
- D) Todas son correctas.**

92. Indique la relación FALSA respecto a los marcadores tumorales:

- A) AFP - Hepatocarcinoma.
- B) CA 125 – Melanoma.**
- C) CA 72.4 – Carcinoma gástrico.
- D) PSA – Próstata.

93. De estos marcadores tumorales, ¿cuál presenta falsos positivos por déficit de vitamina B12?

- A) Antígeno carcinoembrionario.
- B) CA 15.3.**
- C) CA 19.9.
- D) CA 125.

94. En relación al marcador tumoral HE4, ¿cuál de las siguientes es INCORRECTA?

- A) La insuficiencia renal es la principal causa de falsos positivos
- B) Es utilizado en carcinomas de próstata**
- C) Es utilizado en neoplasias ováricas
- D) Se expresa en adenocarcinomas de pulmón

95. De los siguientes, ¿cuál es el marcador tumoral de elección para el melanoma?

- A) SCC

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

B) CEA

C) HE4

D) S-100

96. Un marcador tumoral:

A) Es cualquier sustancia que está relacionada con la presencia o progresión de una neoplasia

B) Es la prueba ideal para diagnosticar la presencia de cualquier neoplasia

C) Los marcadores tumorales son especialmente útiles en la monitorización de la respuesta al tratamiento

D) A y C son correctas

97. Cuál de estos pacientes tendrá mayor probabilidad de tener un carcinoma de próstata a partir de los resultados de un análisis de sangre:

A) PSA total mayor de 10 ng/ml

B) % PSA libre mayor del 35%

C) PSA libre entre 4-10 ng/ml

D) PSA total menor de 5 ng/ml

Explicación. Ojo con esto que liaba. El % de PSA libre respecto a PSA total es patológico. Se empleaba en aquellos casos que el PSA estaba dudoso o ligeramente elevado (entre 4-10 ng/mL)

98. De los siguientes, ¿qué marcadores serían más útiles para el estudio de cáncer de hígado?

A) AFP y PSA

B) CEA y NSE

C) AFP y CEA

D) NSE y PSA

99. ¿Qué sustancia se asocia al cáncer hepatocelular?

A) Monóxido de carbono.

B) Nitritos.

C) Benzopireno.

D) Aflatoxina.

100. El marcador tumoral más útil en el seguimiento del cáncer de próstata es:

A) TPA

B) AFP

C) PSA

D) CEA

101. El marcador tumoral CA125 se utiliza para el seguimiento de tumores de:

A) Tiroides

B) Testículo

C) Ovario

D) Mama

102. ¿Qué marcador tumoral se emplea en el seguimiento del cáncer de mama?

A) HDL

B) CEA 15.3

C) AFP

D) Todas son falsas

103. La hemólisis de la muestra produce mayor indiferencia en la determinación de:

A) CEA (antígeno carcinoembrionario)

B) AFP (alfafetoproteína)

C) NSE (enolasa específica neuronal)

D) Ninguno de los anteriores se ve afectado por la hemólisis de la muestra

104. La proteína S100 utilizada como marcador tumores es útil en:

A) Seguimiento del melanoma maligno

B) Tumores del páncreas

C) Hepatocarcinoma

D) No es útil en ninguno de los tumores anteriores

105. Las concentraciones elevadas de los siguientes marcadores tumorales en suero son de elevada especificidad con el tumor asociado:

A) Calcitonina y cáncer medular de tiroides

B) CEA y Hepatocarcinoma

C) AFP y carcinoma renal

D) PCA y cáncer de pulmón

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

106. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales puede originar un falso positivo por endometriosis?

- A) HCG
- B) CA 15.3
- C) CA 125**
- D) CA 19.9

107. Respecto a los marcadores tumorales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- A) un paciente puede tener una neoplasia y los resultados de los marcadores estar dentro de la referencia
- B) Un paciente puede tener resultado de los marcadores por encima de los valores de referencia y no tener una neoplasia
- C) Resultados de los marcadores por encima de los valores de referencia indican siempre la existencia de una neoplasia**
- D) La gran mayoría de los marcadores tumorales no son órgano-específicos

108. ¿Cuál de los siguientes es un tumor funcionalmente activo asociado a la médula suprarrenal?

- A) Mieloma múltiple
- B) Feocromocitoma**
- C) Carcinoma de la corteza suprarrenal
- D) Blastoma

109. El marcador tumoral más utilizado para el diagnóstico de cáncer prostático es:

- A) TPA.
- B) PSA.**
- C) AFP.
- D) Ca15,3.

110. ¿Cuál de los siguientes marcadores está presente en el carcinoma hepatocelular?

- A) PAP.
- B) PSA.
- C) Ca 125.
- D) AFP.**

111. Para diagnosticar y controlar el tratamiento del cáncer de ovario. Es clínicamente útil el marcador:

- A) Ca 125.**
- B) CEA.
- C) PSA.
- D) ACTH.

112. Respecto al antígeno carcinoembrionario (CEA), señale la respuesta correcta:

- A) Se encuentra niveles séricos elevados únicamente en pacientes con cáncer de mama.
- B) Se encuentra niveles séricos elevados únicamente en pacientes con cáncer de ovario.
- C) Es un marcador muy sensible y específico.
- D) Es un marcador inespecífico de tumor.**

113. Indique cuál de los siguientes es un antígeno oncoplacentario:

- A) CEA.
- B) BhCG.**
- C) CA 125.
- D) AFP.

114. Marque cuál de los siguientes marcadores tumorales está más indicado en el cáncer ovario:

- A) AFP.
- B) CA 125 y HE4.**
- C) CA15.3.
- D) PSA.

115. Utilizaríamos la calcitonina como marcador tumoral si sospechamos...:

- A) Tumor trofoblástico gestacional.
- B) Cáncer de próstata.
- C) Cáncer de tiroides.**
- D) Cáncer de mama.

116. Los marcadores tumorales que nos ofrecen información sobre la evolución de la enfermedad o la respuesta tumoral a un determinado tratamiento se denominan:

- A) Marcadores terapéuticos.
- B) Marcadores de evolución.**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

C) Marcadores diagnósticos.

D) Marcadores genómicos.

117. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales no es proteico?:

A) CEA.

B) Inmunoglobulinas.

C) Cortisol.

D) AFP.

118. En el estudio del cáncer de ovario, se emplean:

A) Ca125.

B) PSA.

C) HE4.

D) A y C son correctas.

119. Los niveles de marcadores tumorales tras una exploración o manipulación en el paciente:

A) No se alteran nunca.

B) No se deben estudiar en ese momento.

C) Pueden aumentar tras la manipulación.

D) B y C son ciertas.

120. En el estudio del cáncer de próstata se pueden emplear los siguientes marcadores tumorales:

A) PAP.

B) AFP.

C) PSA.

D) A y C son ciertas.

121. Respecto a la determinación de marcadores tumorales, indicar que afirmación NO es correcta:

A) En ausencia de neoplasia, los niveles séricos, en la mayoría de los pacientes suelen ser moderados.

B) Algunos marcadores tumorales podrían aparecer elevados si hay alteración en los tejidos productores.

C) Si los niveles séricos tienden a descender indican patología neoplásica.

D) El CEA es un marcador tumoral general, presente en muchos adenocarcinomas.

122. Los niveles normales del Ca 15.3 deben ser inferiores a:

A) 35 U/ml.

B) 50 U/ml.

C) 60 U/ml.

D) 75 U/ml.

123. El marcador tumoral de elección para el cáncer primitivo de hígado es:

A) PSA.

B) CEA-125.

C) AFP.

D) HE4.

124. ¿Qué oncogenes son utilizados como marcadores tumorales para clasificar los tumores de mama hereditarios?:

A) KRAS.

B) BRCA-1 y BRCA-2.

C) AFP.

D) CEA-19-9.

125. Para determinar los marcadores tumorales se suelen usar técnicas:

A) ELISA y RIA.

B) Cromatográficas y Electroforéticas.

C) Nefelométricas y Turbidimétricas.

D) Absorciométricas y Turbidimétricas.

126. En el estudio de cáncer de hígado se emplean:

A) AFP y PSA.

B) CEA y NSE.

C) AFP y CEA.

D) NSE y PSA.

127. Indica que marcador pertenece al grupo de las mucinas

A) Fosfatasa Alcalina.

B) Ferritina

C) CA 125.

D) S100.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

128. Indique cuál es una anomalía de núcleo en una célula neoplásica:

- A) Proteína P.
- B) Glicoproteínas o glicoconjugados transmembrana modificados.
- C) Receptores en diferente número.
- D) Aumento del número de mitosis.

129. Cuando un test rápido inmunocromatográfico cualitativo para la detección de Beta-HCG es positivo en hombres, es indicativo de:

- A) Tumores prostáticos.
- B) Tumores germinales testiculares.
- C) Tumores mamarios masculinos.
- D) Insuficiencia renal aguda.

130. El CA 125 se utiliza como marcador tumoral en:

- A) Cáncer de mama.
- B) Cáncer de colon.
- C) Cáncer de pulmón.
- D) Cáncer de ovario.

131. Un valor elevado del marcador tumoral PSA se utiliza para monitorizar el cáncer de próstata. Este valor también puede verse alterado por:

- A) Hipertrofia de próstata benigna.
- B) Insuficiencia renal.
- C) Embarazo.
- D) Hepatopatía.

132. De los siguientes marcadores tumorales, ¿cuál se utiliza en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer medular de tiroides?

- A) PSA.
- B) S-100.
- C) Calcitonina.
- D) HER-2/neu.

133. Ante una sospecha de carcinoma hepatocelular, el marcador tumoral es:

- A) CEA.
- B) Alfafetoproteína.
- C) CA 125.

D) CA 19.9.

134. Para el seguimiento del cáncer de colon se emplea:

- A) CEA.
- B) PSA.
- C) AFP.

135. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales se emplea en el seguimiento del cáncer de cuello de útero?:

- A) MCA.
- B) SCC.
- C) NSE.

136. En relación con las células tumorales, qué anomalía aparece en el núcleo:

- A) Disminución del tamaño.
- B) Aparición de receptores especiales.
- C) Mayor número de mitosis.

137. ¿Cuál de estas sustancias es un marcador tumoral hormonal?:

- A) Tiroglobulina.
- B) Calcitonina.
- C) Fosfatasa ácida.

138. Ante la sospecha de un cáncer de ovario de tipo seroso, ¿cuál es el marcador más adecuado?

- A) CA 125.
- B) CEA.
- C) CA 19-9.
- D) AFP.

139. Entre las posibilidades de aumentar la especificidad del antígeno prostático específico (PSA) en el diagnóstico de cáncer de próstata destaca la medida en suero de distintas formas moleculares o isoformas de PSA. La forma proPSA es:

- A) Un precursor de PSA unido a antitripsina.
- B) Una forma de PSA libre.
- C) Un precursor de PSA unido a alfa-2-macroglobulina.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

D) Un precursor de PSA unido a albúmina.

140. Los marcadores tumorales pueden servir para:

- A) Estadía de del tumor.
- B) Predicción y seguimiento de la respuesta terapéutica.
- C) Detección de recurrencia.
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

141. ¿Qué antígeno está asociado al tumor de ovarios?

- A) CA 19.9.
- B) CA 125.
- C) CA 15.3.
- D) CA 72.4

142. El marcador tumoral HER -2/neu, es:

- A) Una proteína muy específica que se observa frecuentemente en patologías benignas.
- B) Un marcador que se observa en neoplasia de próstata.
- C) Un oncogen que codifica una proteína transmembrana, sobreexpresado en carcinomas mamarios.
- D) Una enzima glucolítica que se sintetiza en las neuronas, aparece elevada en carcinomas mamarios.

143. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales es el más específico para la detección del cáncer de próstata?

- A) CEA.
- B) PSA.
- C) CA 15-3.
- D) CA 125.

144. Con relación a los marcadores tumorales (MT), indique la incorrecta:

- A) Un MT puede producirse por las células tumorales
- B) Un MT puede reflejar el crecimiento o actividad tumoral
- C) Los MT son específicos de las neoplasias únicamente

D) Un MT puede permitir conocer la evolución o respuesta terapéutica de un tumor maligno

145. Respecto a los marcadores tumorales señale la afirmación falsa:

- A) Ligeros incrementos de algunos marcadores tumorales pueden aparecer en patologías benignas.
- B) Un resultado negativo en los niveles de un marcador tumoral excluye la neoplasia.
- C) Algunos niveles indican la alta probabilidad de presencia de neoplasia.
- D) El CEA elevado no es muy específico de origen neoplásico.

146. En el estudio del cáncer de mama, ¿qué marcadores se emplean para el seguimiento, tras el tratamiento?

- A) AFP y CA 19.9
- B) CEA y CA 125
- C) NSE y AFP
- D) CA 15.3 y CEA

147. ¿Qué marcador se asocia con los tumores de mama?

- A) PSA.
- B) Ca 125.
- C) Ca 15.3.
- D) Ca 19.9.

148. ¿Qué marcador está más relacionado con el cáncer medular de tiroides?

- A) Ca 125.
- B) AFP.
- C) Ca 15.3.
- D) Calcitonina.

149. En el algoritmo de malignidad ovárica ROMA se emplean dos tipos de marcadores. Indique cuáles son:

- A) CA 125 y HE-4.
- B) HE-4 y CA 15.3.
- C) CA 15.3 y PSA.
- D) PSA y CEA.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

150. ¿Qué marcador se utiliza para el cáncer de próstata?

- A) PSA.
- B) AFP.
- C) Ca 125.
- D) Calcitonina.

151. Respecto a los marcadores tumorales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- A) Un paciente puede tener una neoplasia y los resultados de los marcadores estar dentro de los valores de referencia.
- B) Un paciente puede tener resultados de los marcadores por encima de los valores de referencia y no tener una neoplasia.
- C) Resultados de los marcadores por encima de los valores de referencia indican siempre la existencia de una neoplasia.
- D) La gran mayoría de los marcadores tumorales no son órgano-específicos.

152. ¿Qué marcador tumoral en sangre se encuentra más aumentado en el adenocarcinomas de colon y recto?

- A) Ca 125.
- B) Ca 15.3.
- C) Ferritina.
- D) Antígeno carcinoembrionario (CEA).

153. El marcador tumoral PSA se utiliza para ayudar al diagnóstico del cáncer de:

- A) Pulmón de células pequeñas.
- B) Próstata.
- C) Hígado.

154. ¿Qué marcador tumoral se encuentra en sangre?

- A) NMP22.
- B) BTA.
- C) Tiroglobulina.

155. Respecto al antígeno carcinoembrionario (CEA), señale la respuesta correcta:

- A) Es una lipoproteína.

B) Recibe su nombre por encontrarse en tejidos hepáticos.

C) Es un marcador tumoral que se presenta en carcinomas colorrectales y sus metástasis.

D) Es un marcador muy específico.

156. ¿Cuál de las siguientes respuestas es incorrecta, en relación a la alfafetoproteína (AFP)?:

A) Es sintetizada por las glándulas suprarrenales del feto y el saco vitelino.

B) Es de interés su dosificación sérica durante la gestación para detectar malformaciones fetales.

C) Una de sus principales aplicaciones clínicas es en el diagnóstico y seguimiento de carcinomas primitivos de hígado.

D) Se encuentran altas concentraciones en líquido amniótico y suero fetal.

157. Ante la sospecha de carcinoma hepatocelular, el marcador tumoral de elección es:

- A) HCG.
- B) Alfa-fetoproteína (AFP).
- C) CEA.
- D) PSA.

158. ¿Cuál es el marcador tumoral de elección en los carcinomas ováricos?

- A) Alfa – fetoproteína.
- B) Antígeno carbohidratado CA125.
- C) Gonadotropina coriónica.
- D) Antígeno carbohidratado.

159. ¿En qué órgano o tejido se encuentra más elevada la fosfatasa ácida?

- A) Páncreas.
- B) Próstata.
- C) Hígado.
- D) Músculo.

160. ¿Cuál es el principal marcador tumoral específico de la próstata?

- A) Cromogranina A.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

B) PSA.

C) CYFRA 21-1.

D) S-100.

161. Se utiliza como principal marcador tumoral de carcinoma medular de tiroides:

A) Tiroglobulina.

B) Ac antitiroglobulina.

C) Calcitonina.

D) Ac antiperoxidasa.

162. En el cáncer medular de tiroides ¿cuál de los siguientes marcadores tumorales presenta una mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica?

A) Calcitonina.

B) CA 15.3.

C) α – fetoproteína.

D) Antígeno carcinoembrionario.

163. En relación al marcador tumoral CA 19.9 ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

A) Por si sólo no es diagnóstico de la enfermedad.

B) No se debe realizar su determinación si no hay sospecha de tumor.

C) Esta elevado en todos los cánceres de páncreas.

D) Puede ser útil para el seguimiento del tratamiento.

164. En el estudio del cáncer de hígado se emplean como marcadores tumorales:

A) AFP, CEA.

B) CEA, NSE.

C) PSA, NSE.

165. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales es una enzima?

A) Calcitonina.

B) Gastrina.

C) Fosfatasa ácida prostática.

NOTA: si acaba en -ASA muy probablemente sea enzima

166. Uno de los siguientes marcadores tumorales es de alta sensibilidad y especificidad.

A) CEA.

B) CYFRA 21.1.

C) LDH.

D) Calcitonina

167. El Antígeno asociado a los carcinomas escamosos (SCC) está indicado en:

A) Neoplasias de estirpe epidermoide de diferente origen principalmente de laringe, pulmón y cuello uterino.

B) Detección y seguimiento del cáncer de vejiga.

C) Neuroblastoma.

D) Cáncer de mama.

168. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales es un antígeno oncoplacental?

A) Beta HCG.

B) CEA.

C) PSA.

D) CA 125.

169. ¿Qué marcador tumoral se produce en los melanomas?:

A) Fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica.

B) CA 125.

C) CA 54/61.

D) S-100.

170. ¿Cuál de los siguientes parámetros bioquímicos empleados en el diagnóstico del carcinoma de próstata se encuentra generalmente descendido en los pacientes con cáncer frente a los que presentan hiperplasia benigna de próstata o en individuos sanos?:

A) Densidad de antígeno prostático específico.

B) Antígeno prostático específico total.

C) Fracción de antígeno prostático específico libre/Antígeno prostático específico total.

D) Todos los anteriores aumentan en el cáncer de próstata.

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

171. Ante una sospecha de un tumor carcinoide intestinal, usted solicitaría la determinación de:

- A) cromogranina A.
- B) alfa 1- antitripsina.
- C) proteína S-100.
- D) CEA.

172. ¿Cuál de las siguientes características del marcador tumoral CA 15-3 en el diagnóstico de cáncer de mama es VERDADERA?:

- A) Alta especificidad diagnóstica.
- B) Alta sensibilidad diagnóstica en estadios iniciales.
- C) Es muy útil en el seguimiento del tratamiento.
- D) Sus niveles preoperatorios no tienen valor pronóstico

173. ¿Cuál de las siguientes características del marcador tumoral PSA y su relación con el cáncer de próstata es FALSA?

- A) Se utiliza para la evaluación del tratamiento.
- B) Se eleva en prostatitis o hiperplasia benigna de próstata.
- C) La fracción libre de PSA se determina para aumentar la especificidad del PSA total.
- D) Los pacientes con cáncer de próstata tienen la fracción de PSA libre mayor que los individuos sanos o con prostatitis benignas.

174. El HE4 (proteína del epidídimo humano) tiene utilidad principalmente como:

- A) Marcador tumoral de cáncer de ovario.
- B) Marcador tumoral de carcinoma escamoso de cérvix.
- C) Marcador tumoral de cáncer de pulmón.
- D) Marcador tumoral de cáncer de mama

175. Indique cuál de los siguientes marcadores tumorales tiene mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica:

- A) CYFRA 21.1.
- B) B-HCG.
- C) PSA.
- D) CA 19.9.

176. Los marcadores tumorales que se utilizan en el cálculo del índice ROMA son:

- A) CA 15.3 y HE-4.
- B) CA 125 y HE-4.
- C) CA 19.9 y CEA.
- D) CA 125 y CEA.

177. ¿Cuál es generalmente el tipo de muestra preferido para la detección de ADN tumoral circulante (ctDNA)?:

- A) Plasma.
- B) Suero.
- C) Orina.
- D) LCR.

178. El gen BRCA1 se estudia en las pruebas de susceptibilidad al cáncer hereditario de:

- A) Pulmón.
- B) Mama.
- C) Colon.
- D) Tiroides

179. Indique cuál de los siguientes marcadores tumorales es una citoqueratina:

- A) CA 125.
- B) Cyfra 21.1.
- C) PSA.
- D) AFP

180. La hemolisis interfiere en los resultados de algunos marcadores tumorales; sobre todo eleva los niveles séricos de:

- A) Antígeno carcinoembrionario.
- B) Enolasa neuronal específica.
- C) Antígeno prostático específico.
- D) Todos los anteriores.

181. Una mujer de 33 años consulta por un nódulo mamario que se diagnostica de carcinoma ductal. Su madre a los 50 años y su hermana a los 40 han tenido cáncer de mama. Su tía materna a los 45 y su abuela a los 55 han tenido cáncer de ovario. ¿Qué estudio solicitaría?:

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test temas 22 Marcadores tumorales

A) BCRA1.

B) her2.

C) P53.

D) receptor de estrógeno

182. Para la determinación de niveles de cromogranina A se debe suspender previamente el tratamiento del paciente con un fármaco que incrementa falsamente su valor. ¿Cuál de los siguientes produce este error pre-analítico?

A) Inhibidor de la bomba de protones.

B) Ibuprofeno.

C) Corticoides.

D) Colchicina.

183. ¿Cuál de estos marcadores tumorales está constituido principalmente por carbohidratos?

A) AFP.

B) β -HCG.

C) PSA.

D) CA19.9.

184. El marcador tumoral más utilizado para el cáncer medular de tiroides es:

A) CYFRA 21-1

B) SCC

C) NSE

D) Calcitonina

185. ¿Cuál es el principal marcador tumoral que se encuentra elevado en el carcinoma de ovario?

A) CA15.3

B) CA125

C) CA19.9

D) PSA

186. De los siguientes marcadores tumorales producidos por la célula tumoral. ¿Cuál no es un antígeno mucínico?

A) Ca-125

B) Ca -19.9

C) CEA

D) MCA

187. ¿Qué asociación es falsa?

A) Alfa-fetoproteína y tumor de células germinales

B) CA 125 y neuroblastoma (neoplasia del sistema nervioso central)

C) Calcitonina y carcinoma medular del tiroides

D) Antígeno específico prostático y neoplasia de próstata

188. ¿Cuál de los siguientes es un marcador tumoral:

A) Anticuerpos antifosfolípido

B) Cistatina C

C) Antígeno Carcinoembrionario

D) Mioglobina

189. La fosfatasa ácida es un marcador asociado a:

A) Cáncer de próstata.

B) Cáncer de páncreas.

C) Adenocarcinoma.

D) Linfoma.

190. Los marcadores tumorales no son:

A) Electrolitos

B) Antígenos tumorales

C) Hormonas y enzimas

D) Antígenos oncofetales

191. En un paciente que tenía antes de ser operado de una neoplasia de colon un valor de CEA muy elevado y que después de la cirugía se normalizo, ¿qué significado puede tener el aumento a 10 veces el valor normal del marcador en la revisión realizada a los dos años?:

A) Un fallo en el metabolismo del marcador

B) Una posible recidiva del tumor

C) Un efecto de la variabilidad biológica de cada individuo

D) Una disminución en la eliminación del marcador por fallo renal

192. Los genes que han sufrido variaciones en la secuencia de nucleótidos por mutación, amplificación o reordenamiento cromosómico se llaman:

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES
Test temas 22 Marcadores tumorales

A) Protooncogenes.

B) Oncogenes.

C) Carcinogenes.

D) Apoptogenes.

193. No está aumentada la tiroglobulina, en:

A) Cirrosis biliar.

B) Embarazo.

C) Nefrosis.

D) Hepatitis crónica activa.