



## Protocolo para realizar tratamientos quirúrgicos

### Clínica Universitaria de Odontología

## TECNICA DE EXODONCIA SIMPLE

### 1 INSTRUMENTAL

- 1-kit básico de cirugía (Jeringa de anestesia, bisturí, Minnesota, Periostotomo, pinza de Adson, Legra, Portaagujas y tijeras.) (nº artículo 16)
- 2-Botadores (nº artículo: 21 finos, 22 medio y 23 grueso)
- 3- Winter derecho e izquierdo: para arcada inferior. (nº artículo 19)
- 4-Forceps (según diente que extraer: ver catálogo)

### 2-MATERIAL FUNGIBLE:

- Elementos de protección personal (bata, gorro, mascarilla, guantes y gafas)
- Material básico para el paciente (babero, eyector, servilleta y vaso desechable)
- Gasas
- Colutorio de clorhexidina
- Paño estéril. Para montar el campo
- Anestesia y aguja (30G)
- Sutura

### PROCEDIMIENTO:

- 1-Enjuague con clorhexidina
- 2-Anestesia con aguja corta. Tipo de anestesia adecuado al procedimiento
- 3-Uso del sindesmotomo para separar las fibras periodontales del cemento del diente
- 4-Luxacion y elevación con los botadores rectos y curvos (arcada inferior)
- 5-Prension del diente lo mas apical posible con el fórceps correspondiente
- 6-Legrado del alveolo con la legra
- 7-Alveolotripsia
- 8-Sutura si precisa (Porta agujas, Pinza de Adson y Tijera)
- 9- Colocar una gasa mordiendo durante un mínimo de 20 minutos

# TECNICA DE EXODONCIA QUIRURGICA

## 1 INSTRUMENTAL

- 1-kit básico de cirugía (Jeringa de anestesia, bisturí, Minnesota, Periostotomo, pinza de Adson, Legra, Portaagujas y tijeras.) (nº artículo 16)
- 2-Botadores (nº artículo: 21 finos, 22 medio y 23 grueso)
- 3- Winter derecho e izquierdo: para arcada inferior. (nº artículo 19)
- 4-Forceps (según diente que extraer: ver catálogo)
- 5-Pieza de mano
- 6-Fresas quirúrgicas redondas y de odontosección
- 7-Mosquito
- 8-lima de hueso
- 9-Gubia

## 2-MATERIAL FUNGIBLE:

- Elementos de protección personal (bata, gorro, mascarilla, guantes y gafas)
- Material básico para el paciente (babero, eyector, servilleta y vaso desechable)
- Gasas
- Colutorio de clorhexidina
- Paño estéril. Para montar el campo.
- Anestesia y aguja (30G)
- Sutura

## PROCEDIMIENTO:

- 1-Enjuague con clorhexidina
- 2-Anestesia con aguja corta. Tipo de anestesia adecuado al procedimiento
- 3-Uso del sindesmotomo para separar las fibras periodontales del cemento del diente
- 4-Bisturi para hacer descargas o incisiones, si precisa
- 5-Osteotomía (fresa quirúrgica redonda) y odontosección (fresas de odontosección)
- 5-Luxacion y elevación con los botadores rectos y curvos (arcada inferior)
- 6-Prension del diente lo más apical posible con el fórceps correspondiente. Si se precisa
- 7- Retirada de posibles esquirlas y regularización de los bordes: gubia y lima de hueso
- 8-Legrado del alveolo con la legra
- 7-Alveolotripsia
- 8-Sutura (Porta agujas, pinza de Adson, tijera y sutura)
- 9- Colocar una gasa mordiendo durante un mínimo de 20 minutos

## **CONTROL POSTOPERATORIO**

- 1-Evitar escupir o succionar, para evitar movilizar el coágulo
- 2-No hacer enjuagues profusos en las primeras 8 horas: a partir de ahí realizar enjuagues salino o clorhexidina si esta contraindicada la sal como en hipertensos o insuficiencia cardiaca
- 3-Aplicar hielo en la zona como antinflamatorio
- 4-Evitar el ejercicio físico
- 5-No fumar
- 6-No beber alcohol
- 7-Mantenga una dieta adecuada frio-templada y blanda
- 8-Ser preciso y reiterativo en que tomen la medicación que se les pauté.
- 9-Acudir a las revisiones concertadas
- 10-En caso de complicaciones. Fiebre, sangrado que no cesa etc. Consultar con la CLUO

## **PRESCRIPCION ANTIBIOTICA Y ANALGESICA**

### **ANTIBIOTICOS:**

- 1º Opción Amoxicilina 875 mg/ con 125 ac. clavulánico o Amoxicilina 750mg o 1gr. Posología 1 cada 8 horas 7 días
- 2ª Opción en alérgicos a la penicilina: clindamicina 300 mg/6 horas 7-10 días
- 3ª Opción: Claritromicina 500 cada 12 horas 7-10 días

### **ANALGESICOS:**

- Paracetamol 650-mg o 1 gr cada 8 horas hasta 7 días
- Metamizol magnésico 500 mg cada 8 horas hasta 7 días

### **ANTINFLAMATORIO:**

- Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas hasta 7 días  
Dexketoprofeno 25 mg cada 8 horas hasta 7 días  
Naproxeno 500 cada 12 horas hasta 7 días