

## **Protocolo para realizar tratamientos quirúrgicos a pacientes con medicación que modifica la hemostasia**

### **Clínica Universitaria de Odontología**

Para realizar determinadas técnicas quirúrgicas como exodoncias, implantes dentales, cirugía periodontal etc, es preciso que interrumpa el tratamiento del siguiente modo:

**1.Sintrom®:** El paciente no dejará de tomarlo, pero precisará de una analítica que confirme que su INR encuentre entre 2-3. No se extraerán más de 3 piezas consecutivas.

-En caso de cirugías muy cruentas, INR fuera de rango, dejará de tomarlo 5 días antes de la realización del tratamiento quirúrgico y en su lugar se pondrá inyecciones de heparina de bajo peso molecular. (excepto el mismo día de la exploración).

-Volverá a tomarlo, generalmente un día después de la cirugía a la dosis pautada en su hoja de dosificación para ese día.

**2.Aldocumar®:** El paciente dejará de tomarlo 5 días antes de la realización del tratamiento quirúrgico y en su lugar se pondrá inyecciones de Fraxiparina 0,6 (excepto el mismo día de la exploración).

-Volverá a tomarlo, generalmente un día después de la cirugía a la dosis pautada en su hoja de dosificación para ese día.

**3.Clopidogrel (Plavix® o Iscover®), Ticlopidina (Tiklid®), Ticagrelor (Brilique®), Prasugrel (Effient®) o Clopidogrel con aspirina (Duoplavin®)**

El paciente no los tomará en los 7 días previos.

- Se le indicará si debe tomar algún tratamiento alternativo en sustitución generalmente Adiro® 100mg un comprimido al día.

-Volverá a tomarlo cuando y como le indiquemos en la CLUO, generalmente al día siguiente de la endoscopia.

4.- Si está tomando **Dabigatran (Pradaxa®)**, **Rivaroxabán (Xarelto®)**, **Apixabán (Eliquis®)**, o **Edoxabán (Lixiana®)**, no los tomará desde 3 días antes del tratamiento quirúrgico.

-Si tiene insuficiencia renal y toma Dabigatran el periodo de suspensión puede ser mayor, hasta 5 días si el aclaramiento de creatinina está entre 30-50.

-Volverá a tomarlo generalmente al día siguiente del procedimiento.