



PROTOCOLO CLÍNICO EDUCACIÓN EN HIGIENE ORAL

Clínica Universitaria de Odontología

La **educación en higiene oral** es una parte esencial de la prevención y tratamiento de enfermedades bucales, especialmente en el contexto periodontal. Su objetivo es capacitar al paciente para que mantenga una boca limpia y saludable a lo largo del tiempo.

1. OBJETIVOS

- Reducir la carga bacteriana en dientes y encías.
- Prevenir caries y enfermedad periodontal.
- Mantener los resultados del tratamiento periodontal.

2. EVALUACIÓN DEL PACIENTE

Antes de nada, se debe observar:

- Técnica de cepillado actual.
- Uso (o no) de complementos: hilo dental, cepillos interproximales, irrigadores, etc.
- Índice de placa y sangrado.
- Condiciones anatómicas especiales: ortodoncia, implantes, prótesis, recesiones, etc.
- Nivel de motivación y hábitos (tabaco, dieta, rutina diaria).

3. ENSEÑANZA DE TÉCNICAS DE HIGIENE

Hemos de mostrarle al paciente en su boca las técnicas de higiene, individualizando las técnicas y probando los distintos diámetros de cepillos interdentes. Haremos hincapié en las zonas posteriores o de difícil acceso (prótesis fijas, ortodoncia, implantes...)

Cepillado dental:

- Técnica recomendada: **Bass modificada** (para pacientes periodontales).
 - Inclínalo a 45° hacia la encía y barrido de la encía al diente.
 - Movimientos suaves y vibratorios en cada zona.
 - No más de 2 dientes por vez.
- Frecuencia: mínimo **2 veces al día**, ideal después de cada comida.
- Cepillo: suave o medio, cabezal pequeño, mango cómodo.

Higiene interdental:

- Esencial para mantener la salud oral. El 40% de la superficie dental se encuentra en el espacio interdental.
- Elegir según el espacio interdental:
 - **Hilo dental:** para espacios muy cerrados y para prevención de caries. El uso de los cepillos interdentes no exime el de la seda dental.
 - **Cepillos interproximales** en pacientes periodontales. Han de adaptarse al espacio de la trónea, lo habitual es que el paciente tenga dos o tres tamaños. Se aconsejan cepillos interproximales cónicos para las tróneas posteriores.
 - **Irrigador bucal:** como complemento, útil en ortodoncia o pacientes con limitaciones físicas.

Lengua:

- Cepillar con cepillo o raspador lingual para reducir halitosis y bacterias.

4. RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS

Dentífricos:

- Con flúor (2500 ppm) para prevenir la caries.
- Con triclosán o CPC en casos de enfermedad periodontal activa.

Enjuagues:

- Clorhexidina 0.12% cada 12 horas en fase de tratamiento periodontal (uso limitado: 2 semanas máximo). Se iniciará con el colutorio el día que se inicia el raspado y alisado radicular
- Enjuagues sin alcohol de uso diario (ej. CPC, triclosán).

5. MOTIVACIÓN Y REFUERZO

- Uso de espejo para enseñar la técnica.
- Registro de placa antes/después para mostrar resultados.
- Fotos clínicas comparativas (antes y después).
- Incluir al paciente en el plan de higiene personalizado.
- Revisiones periódicas para corregir fallos.

Consejo: En la página web del Consejo de Dentistas o en su canal de YouTube, hay vídeos muy interesantes de enseñanza de higiene oral:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL1lbDNpSiy2JG2m2UqPKUZt4favxBN-G-D>