


Camino Natural por los senderos tradicionales de El Hierro

Sendero GR-131. Tramo 4: Ermita Virgen de Los Reyes - Faro de Orchilla



Provincia: Madrid



Comunidad Autónoma:
Comunidad de Madrid



Longitud: 32.21 km

Algas

***Algas supremus* (Linneaeaus, 213)**

☐ Estado de conservación desconocido



Créditos: Sara Navarro

Es un alga pequeña, de color rojo rosado y muy ramificada, que crece formando grupos densos que parecen algodón, llegando a tener hasta 1 cm de grosor. Se fija al suelo marino o a otras algas mediante pequeñas raíces. Sus tallos son delgados y se levantan, creando una forma como de manto. Al final de muchas de sus ramitas se pueden observar unas células especiales con forma de huevo pequeño. El alga en total mide entre 0.5 y 1.5 cm de largo.

***Algas supremus* (Linneaeaus, 213)**

☐ Estado de conservación desconocido



Créditos: Sara Navarro

Es un alga pequeña, de color rojo rosado y muy ramificada, que crece formando grupos densos que parecen algodón, llegando a tener hasta 1 cm de grosor. Se fija al suelo marino o a otras algas mediante pequeñas raíces. Sus tallos son delgados y se levantan, creando una forma como de manto. Al final de muchas de sus ramitas se pueden observar unas células especiales con forma de huevo pequeño. El alga en total mide entre 0.5 y 1.5 cm de largo.

***Algas supremus* (Linneaeaus, 213)**

☐ Estado de conservación desconocido



Créditos: Sara Navarro

Es un alga pequeña, de color rojo rosado y muy ramificada, que crece formando grupos densos que parecen algodón, llegando a tener hasta 1 cm de grosor. Se fija al suelo marino o a otras algas mediante pequeñas raíces. Sus tallos son delgados y se levantan, creando una forma como de manto. Al final de muchas de sus ramitas se pueden observar unas células especiales con forma de huevo pequeño. El alga en total mide entre 0.5 y 1.5 cm de largo.

Aves

Bengalí rojo (*Amandava amandava* (Linnaeus, 1758))

● VU (Vulnerable)

⚠ Especie invasora



Créditos: Robert Martin

Este charrán es un ave de tamaño mediano, de color pálido. Su espalda y alas son grises claras, con la parte baja de la espalda y la cola blancas, esta última con una forma de horquilla. En verano, los adultos tienen la cabeza negra, pico rojo con la punta negra y patas rojas. En invierno, su frente se vuelve blanca y el pico oscuro. Los jóvenes tienen un tono ocre en la espalda, con marcas marrones y blancas, pico oscuro con la parte inferior naranja y patas naranja pálido. Los jóvenes también tienen una línea oscura en el borde del ala. Una característica útil para identificarlo es que, cuando está posado, la cola no sobresale más allá de las alas. Su vuelo es un poco más pesado en comparación con otros charranes parecidos.

Bengalí rojo (*Amandava amandava* (Linnaeus, 1758))

● VU (Vulnerable)

⚠ Especie invasora



Créditos: Robert Martin

Este charrán es un ave de tamaño mediano, de color pálido. Su espalda y alas son grises claras, con la parte baja de la espalda y la cola blancas, esta última con una forma de horquilla. En verano, los adultos tienen la cabeza negra, pico rojo con la punta negra y patas rojas. En invierno, su frente se vuelve blanca y el pico oscuro. Los jóvenes tienen un tono ocre en la espalda, con marcas marrones y blancas, pico oscuro con la parte inferior naranja y patas naranja pálido. Los jóvenes también tienen una línea oscura en el borde del ala. Una característica útil para identificarlo es que, cuando está posado, la cola no sobresale más allá de las alas. Su vuelo es un poco más pesado en comparación con otros charranes parecidos.

Invertebrados

Geomalacus anguiformis (Morelet, 1845)

● LC (Preocupación menor)



Créditos: Vsevolud Rudyi

Esta babosa mide unos 7 centímetros de largo. Las babosas jóvenes son de color entre negro y azulado, con pequeños bultos blancos y cuatro líneas casi negras en el lomo. Conforme crecen, se aclaran y el azul se vuelve más fuerte, escondiendo los bultos blancos. Las líneas del lomo se hacen más gruesas. Las babosas adultas tienen el lomo marrón, los lados amarillentos y cuatro líneas marrones oscuras, casi negras, en el lomo. La parte inferior del pie es blanquecina, y la baba que produce es amarillenta.

***Geomalacus anguiformis* (Morelet, 1845)**

 LC (Preocupación menor)



Créditos: Vsevolud Rudyi

Esta babosa mide unos 7 centímetros de largo. Las babosas jóvenes son de color entre negro y azulado, con pequeños bultos blancos y cuatro líneas casi negras en el lomo. Conforme crecen, se aclaran y el azul se vuelve más fuerte, escondiendo los bultos blancos. Las líneas del lomo se hacen más gruesas. Las babosas adultas tienen el lomo marrón, los lados amarillentos y cuatro líneas marrones oscuras, casi negras, en el lomo. La parte inferior del pie es blanquecina, y la baba que produce es amarillenta.

***Geomalacus anguiformis* (Morelet, 1845)**

 LC (Preocupación menor)




Créditos: Vsevolud Rudyi

Esta babosa mide unos 7 centímetros de largo. Las babosas jóvenes son de color entre negro y azulado, con pequeños bultos blancos y cuatro líneas casi negras en el lomo. Conforme crecen, se aclaran y el azul se vuelve más fuerte, escondiendo los bultos blancos. Las líneas del lomo se hacen más gruesas. Las babosas adultas tienen el lomo marrón, los lados amarillentos y cuatro líneas marrones oscuras, casi negras, en el lomo. La parte inferior del pie es blanquecina, y la baba que produce es amarillenta.

Mamíferos

Murciélago orejudo dorado (*Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758))

 DD (Datos insuficientes)

 **Especie invasora**



Créditos: Anthony Batista

Este murciélago es de tamaño mediano y destaca por sus orejas largas y unidas en la base. Dentro de la oreja, tiene una estructura blanquecina y casi transparente. Su pelaje es abundante y largo, de color entre marrón amarillento y marrón grisáceo en la espalda, mientras que en la parte inferior es gris claro con toques amarillentos. Los murciélagos jóvenes tienen un color más pálido y la cara más oscura. Es difícil distinguirlo de otras especies similares a simple vista. Emite sonidos de alta frecuencia mientras busca comida, alcanzando su punto máximo alrededor de 50 kHz.

Murciélago orejudo dorado (*Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758))

DD (Datos insuficientes)

⚠ Especie invasora



Créditos: Anthony Batista

Este murciélago es de tamaño mediano y destaca por sus orejas largas y unidas en la base. Dentro de la oreja, tiene una estructura blanquecina y casi transparente. Su pelaje es abundante y largo, de color entre marrón amarillento y marrón grisáceo en la espalda, mientras que en la parte inferior es gris claro con toques amarillentos. Los murciélagos jóvenes tienen un color más pálido y la cara más oscura. Es difícil distinguirlo de otras especies similares a simple vista. Emite sonidos de alta frecuencia mientras busca comida, alcanzando su punto máximo alrededor de 50 kHz.

Murciélago orejudo dorado (*Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758))

DD (Datos insuficientes)

⚠ Especie invasora



Créditos: Anthony Batista

Este murciélago es de tamaño mediano y destaca por sus orejas largas y unidas en la base. Dentro de la oreja, tiene una estructura blanquecina y casi transparente. Su pelaje es abundante y largo, de color entre marrón amarillento y marrón grisáceo en la espalda, mientras que en la parte inferior es gris claro con toques amarillentos. Los murciélagos jóvenes tienen un color más pálido y la cara más oscura. Es difícil distinguirlo de otras especies similares a simple vista. Emite sonidos de alta frecuencia mientras busca comida, alcanzando su punto máximo alrededor de 50 kHz.

Peces

Organismo medusiforme (*Medusais cuasi* (Morelet, 1234))

NT (Casi amenazado)



Créditos: Diego González Dopico

Este organismo marino parece una pequeña medusa gelatinosa, pero sin aguijón. Mide entre 7 y 12 cm de largo y es transparente. Tiene una forma ovalada y aplanada a los lados. Para comer, usa dos grandes labios que tiene a cada lado de la boca, y debajo de ellos hay otros cuatro más pequeños. Lo más llamativo son las ocho bandas a lo largo de su cuerpo formadas por pequeños peines que brillan con colores del arcoíris durante el día y con un color verde brillante por la noche. Tiene cuatro líneas profundas y fáciles de ver en su cuerpo.

Organismo medusiforme (*Medusais cuasi* (Morelet, 1234))

● NT (Casi amenazado)




Créditos: Diego González Dopico

Este organismo marino parece una pequeña medusa gelatinosa, pero sin aguijón. Mide entre 7 y 12 cm de largo y es transparente. Tiene una forma ovalada y aplanada a los lados. Para comer, usa dos grandes labios que tiene a cada lado de la boca, y debajo de ellos hay otros cuatro más pequeños. Lo más llamativo son las ocho bandas a lo largo de su cuerpo formadas por pequeños peines que brillan con colores del arcoíris durante el día y con un color verde brillante por la noche. Tiene cuatro líneas profundas y fáciles de ver en su cuerpo.

Organismo medusiforme (*Medusais cuasi* (Morelet, 1234))

● NT (Casi amenazado)



Créditos: Diego González Dopico

Este organismo marino parece una pequeña medusa gelatinosa, pero sin aguijón. Mide entre 7 y 12 cm de largo y es transparente. Tiene una forma ovalada y aplanada a los lados. Para comer, usa dos grandes labios que tiene a cada lado de la boca, y debajo de ellos hay otros cuatro más pequeños. Lo más llamativo son las ocho bandas a lo largo de su cuerpo formadas por pequeños peines que brillan con colores del arcoíris durante el día y con un color verde brillante por la noche. Tiene cuatro líneas profundas y fáciles de ver en su cuerpo.

Plantas vasculares

Gaviotón (*Xema sabini* (Sabine, 1819))

● CR (En peligro crítico)



La gaviota de Sabine es una gaviota pequeña con alas largas y vuelo elegante. Es fácil de identificar por su cola ligeramente ahorquillada, algo que no tienen otras gaviotas europeas. En verano, la cabeza del adulto es gris con un collar negro fino que destaca sobre el cuello blanco. En invierno, su cabeza se vuelve más blanca con manchas oscuras. Su cuerpo es blanco por debajo y gris por encima. Lo más llamativo son sus alas: tienen un triángulo blanco en la parte superior que contrasta con el gris del resto del ala y el negro de la punta. Las gaviotas jóvenes tienen un color marrón-grisáceo oscuro en la espalda y la cabeza, pero mantienen el mismo dibujo característico en las alas.

Gaviotón (*Xema sabini* (Sabine, 1819))

● CR (En peligro crítico)



La gaviota de Sabine es una gaviota pequeña con alas largas y vuelo elegante. Es fácil de identificar por su cola ligeramente ahorquillada, algo que no tienen otras gaviotas europeas. En verano, la cabeza del adulto es gris con un collar negro fino que destaca sobre el cuello blanco. En invierno, su cabeza se vuelve más blanca con manchas oscuras. Su cuerpo es blanco por debajo y gris por encima. Lo más llamativo son sus alas: tienen un triángulo blanco en la parte superior que contrasta con el gris del resto del ala y el negro de la punta. Las gaviotas jóvenes tienen un color marrón-grisáceo oscuro en la espalda y la cabeza, pero mantienen el mismo dibujo característico en las alas.