
APELLIDOS: GRUPO:

NOMBRE: NIF: N^o HOJAS

ALEM
Grado en Ingeniería Informática
14 de julio de 2017

1. Sean A, B, C tres conjuntos. Demuestra que $A \cup B \subseteq B \cap C$ si, y sólo si, $A \subseteq B \subseteq C$.
2. Sea $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ y R la relación en X definida por:

$$xRy \quad \text{si} \quad 5 \mid 2x + 3y$$

- a) Demuestra que R es una relación de equivalencia.
 - b) Calcula la clase de equivalencia del 1.
 - c) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto cociente? ¿Cuáles son?
3. Dado el sistema de congruencias:

$$17x - 9 \equiv 19 \pmod{24}$$

$$52x \equiv 65 \pmod{105}$$

decide razonadamente si tiene solución y en caso de respuesta afirmativa, encuéntrala y di razonadamente cuántas tiene comprendidas entre 0 y 1000.

4. Determina todos los números de dos cifras que al escribirlos en hexadecimal se escriben con las mismas cifras pero en orden inverso.
5. Sea $A = \mathbb{Z}_3[x]_{x^4+2x^3+2x^2+x+1}$.
 - a) Estudia si A es un cuerpo.
 - b) Calcula, si es posible, la expresión reducida para los siguientes elementos de A :
 - $(x^2 + 2x + 2)^2$.
 - $(x^3 + x + 2)^{-1}$.
 - c) ¿Cuántos elementos de A tienen inverso para el producto?
6. En una asamblea que consta de 6 hombres y 7 mujeres, ¿de cuantas maneras es posible elegir un comité en las siguientes condiciones?:
 - a) El comité está formado por 7 personas.
 - b) El comité está formado por 7 personas entre las que debe haber más mujeres que hombres.
 - c) El comité está formado por 4 hombres y 3 mujeres, pero hay un hombre y una mujer que no pueden estar juntos en el comité.
7. En el espacio vectorial \mathbb{Q}^3 consideramos el conjunto $B = \{(2, 1, 3), (1, -1, 2), (1, -3, 2)\}$.
 - a) Comprueba que B es una base de \mathbb{Q}^3 .
 - b) Calcula la matriz del cambio de base de B_c a B , donde B_c es la base canónica de \mathbb{Q}^3 .
 - c) Sea u un vector cuyas coordenadas en B son $(3, -2, 1)$. ¿De qué vector se trata?
 - d) Sea v el vector $(-2, 1, -3)$. ¿Cuáles son sus coordenadas en B ?

8. Consideremos en $(\mathbb{Z}_5)^4$ los siguientes subespacios vectoriales:

$$U_1 = \{(x, y, z, t) \in (\mathbb{Z}_5)^4 : x + 4y = 0, z + 4t = 0\}$$

$$U_2 = \text{L}[(0, 1, 2, 0), (0, 3, 1, 0)]$$

$$U_3 = \{(x, y, z, t) \in (\mathbb{Z}_5)^4 : x + 4y + 3z + 2t = 0\}$$

a) Calcula una base del subespacio $U_1 + U_2$.

b) Decide razonadamente si $U_3 = U_1 + U_2$. En caso afirmativo, ¿es dicha suma directa?

9. Sea $a \in \mathbb{Z}_7$ y $f : (\mathbb{Z}_7)^3 \rightarrow (\mathbb{Z}_7)^3$ la aplicación lineal cuya matriz en la base canónica de dicho espacio es

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$$

Según el parámetro a estudia la dimensión del núcleo y de la imagen de f .

Indica para que valores del parámetro a es la aplicación f inyectiva y/o sobreyectiva.

10. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{Z}_{11})$.

a) Estudia si A es o no diagonalizable. En caso afirmativo, encuentra una matriz regular P de forma que $P^{-1}AP$ sea una matriz diagonal.

b) Calcula A^{321} .

c) Encuentra, si es posible, una matriz B tal que $B^2 = A$.