


ATLAS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Guía Visual de Prevención, Transmisión y Clínica



Sangre / Sistémico



Aéreo



Gotas



Sexual



Vacunación



Vector



Contacto



Digestivo



Piel / Mucosas

VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana)



Agente: Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV)

↓ Transmisión

Sexual (semen, fluidos vaginales),
Sangre/Fluidos (transfusiones,
agujas, heridas), Madre-hijo.



🛡️ Prevención Ciudadana

Sexo seguro (métodos barrera -
preservativos), Higiene (no compartir
agujas).

🏥 Prevención Hospitalaria

Precauciones estándar.
Nota: Si riesgo de contacto
con fluidos: Guantes, bata,
gafas, mascarilla.




🩺 Clínica (Sistémico)

Fiebre, fatiga, infecciones oportunistas.



Signo Característico:
Inmunosupresión progresiva.



Hepatitis B (VHB)



Agente: Virus de la Hepatitis B (HBV)

↓ Transmisión

Sexual (semen, fluidos vaginales),
Sangre/Fluidos (transfusiones,
agujas, heridas), Madre-hijo.



🛡️ Prevención Ciudadana

Vacunación , Sexo seguro
(preservativos), Higiene (no compartir
agujas).



🏥 Prevención Hospitalaria

Precauciones estándar +
Vacunación personal.

Nota: Si riesgo de contacto
con fluidos: Guantes, bata,
gafas, mascarilla.




🩺 Clínica (Digestivo)

Fatiga, náuseas, dolor abdominal.



Signo Característico:

Ictericia (piel y ojos amarillos).





Agente: SARS-CoV-2

↓ Transmisión

Gotas (tos, estornudos, hablar),
Contacto con superficies (manos).



🛡️ Prevención Ciudadana

Protección personal (Mascarilla quirúrgica), Higiene (Lavado de manos, ventilación, evitar aglomeraciones).



🏥 Prevención Hospitalaria


Aislamiento por gota 💧
(Guantes, bata, gafas, mascarilla quirúrgica).

Nota: Si se usan aerosoles:
mascarilla FFP2.



🩺 Clínica (Respiratorio)

Fiebre, tos, disnea.



Signo Característico:
Anosmia (pérdida de gusto/olfato).

Mascarilla
quirúrgica



Gota

Mascarilla
FFP2/N95



Aerosoles

Varicela 🏠

Agente: Virus Varicela-Zoster (VZV)


↓ **Transmisión:** Aire (inhalación),
Contacto con lesiones.

Prev. Ciudadana:
Vacunación 💉, Higiene.

🏥 **Prev. Hospitalaria:**
Aislamiento por aire ⇌
(Guantes, bata, FFP2).

Clínica: Fiebre.

⚠️ **Característico:**
Lesiones vesiculares pruriginosas.



Mononucleosis 🩸

Agente: Virus Epstein-Barr (EBV)


↓ **Transmisión:** Gotas, Contacto
con saliva (besos).

Prev. Ciudadana: Higiene
(no compartir cubiertos,
no besos).

🏥 **Prev. Hospitalaria:**
Precauciones estándar.

🩺 **Clínica:**
Fiebre, fatiga, faringitis.

⚠️ **Característico:**
Linfocitos atípicos.



Tuberculosis

Agente: Mycobacterium tuberculosis

↓ **Transmisión:** Aire (inhalación gotículas).

Prev. Ciudadana: Mascarilla quirúrgica, Ventilación.

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Aislamiento por aire ⇄ (FFP2/FFP3, guantes, bata).

🩺 **Clínica:** Tos crónica, fiebre, pérdida de peso.

⚠️ **Característico:**
Sangre en esputo.



FFP3

Neumonía bacteriana

Agente: Streptococcus pneumoniae

↓ **Transmisión:** Gotas, Contacto secreciones.

Prev. Ciudadana: Mascarilla, Lavado manos, Vacunación.

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Aislamiento por gotas 💧 (Guantes, bata, mascarilla).

🩺 **Clínica:**
Fiebre, tos, disnea.

⚠️ **Característico:**
Consolidación radiológica.



Mascarilla quirúrgica

Gonorrrea

Agente: Neisseria gonorrhoeae


 **Transmisión:** Sexual (fluidos).

Prev. Ciudadana: Sexo seguro (preservativos).

 **Prev. Hospitalaria:** Precauciones estándar.

 **Clínica:** Disuria.

 **Característico:** Secreción purulenta.



Clamidia

Agente: Chlamydia trachomatis

 **Transmisión:** Sexual (fluidos).

Prev. Ciudadana: Sexo seguro (preservativos).

 **Prev. Hospitalaria:** Precauciones estándar.

 **Clínica:** A menudo asintomática, disuria.

 **Característico:** Secreción mucopurulenta.



Salmonelosis 🤢



Agente: Salmonella spp.

↓ **Transmisión:** Alimentos/agua, Fecal-oral.

Prev. Ciudadana: Higiene, Cocción adecuada.

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Precauciones estándar.

🩺 **Clínica:** Diarrea, fiebre, dolor abdominal.

⚠️ **Característico:** Inicio brusco tras ingestión.



Botulismo 🧠

Agente: Clostridium botulinum

↓ **Transmisión:** Alimentos mal conservados, Heridas.

Prev. Ciudadana: Evitar conservas caseras dudosas.

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Precauciones estándar.

🩺 **Clínica:** Visión doble, dificultad respiratoria.

⚠️ **Característico:** Parálisis flácida.



Malaria

Agente: Plasmodium spp.

 **Transmisión:** Vector  (mosquito Anopheles).

Prev. Ciudadana: Mosquiteros, repelentes.

 **Prev. Hospitalaria:** Precauciones estándar.

 **Clínica:** Fiebre periódica, escalofríos.

 **Característico:**
Anemia.



Leishmaniosis

Agente: Leishmania spp.

 **Transmisión:** Vector  (flebótomo).

Prev. Ciudadana: Evitar picaduras, repelentes.

 **Prev. Hospitalaria:** Precauciones estándar.

 **Clínica:** Fiebre, úlceras cutáneas.

 **Característico:**
Hepatoesplenomegalia.



Toxoplasmosis 🤢



Agente: Toxoplasma gondii

⬇️ **Transmisión:** Carne cruda, Heces de gato.

Prev. Ciudadana: Cocinar carne, Higiene (tierra/gatos).

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Precauciones estándar.

🩺 **Clínica:** Fiebre.

⚠️ **Característico:** Afectación ocular/neurológica.



Anisakis 🤢



Agente: Anisakis spp.

⬇️ **Transmisión:** Pescado crudo.

Prev. Ciudadana: Buena cocción o congelación.

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Precauciones estándar.

🩺 **Clínica:** Dolor abdominal, náuseas.

⚠️ **Característico:** Sensación de cuerpo extraño en estómago.



Sarna



Agente: *Sarcoptes scabiei*

↓ **Transmisión:** Contacto directo 🖐️.

Prev. Ciudadana: Higiene, evitar contacto.

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Aislamiento de contacto (Guantes, bata).

🩺 **Clínica:** Prurito intenso nocturno.

⚠️ **Característico:** Surcos en piel.



Pediculosis



Agente: *Pediculus humanus*

↓ **Transmisión:** Contacto directo 🖐️.

Prev. Ciudadana: Higiene, no compartir objetos.

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Aislamiento de contacto (Guantes, bata).

🩺 **Clínica:** Prurito.

⚠️ **Característico:** Liendres adheridas al pelo.



Candidiasis



Agente: *Candida albicans*

Transmisión

Contacto directo, sobrecrecimiento por humedad.

Prevención Hospitalaria

Aislamiento de contacto 🖐️
(Guantes).

Prevención Ciudadana

Higiene, evitar humedad prolongada en pliegues.

Clínica (Piel/Mucosas)

Placas blancas, prurito intenso.



Signo Característico: Placas blanquecinas en mucosa oral/genital, mal olor.

Tiña



Agente: Dermatofitos (*Trichophyton*)

↓ **Transmisión:** Contacto directo, superficies.

Prev. Ciudadana: Higiene (no compartir calzado).

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Aislamiento de contacto 🖐️.

🩺 **Clínica:** Lesiones circulares.



⚠️ **Característico:** Borde activo con centro más claro.

Onicomycosis



Agente: Dermatofitos / levaduras

↓ **Transmisión:** Contacto directo.

Prev. Ciudadana: Higiene uñas (utensilios propios).

🏥 **Prev. Hospitalaria:** Aislamiento de contacto 🖐️.

🩺 **Clínica:** Engrosamiento, decoloración.

⚠️ **Característico:** Uñas amarillentas y engrosadas.



RESUMEN: Protocolos de Aislamiento Hospitalario



AIRE

(Respirador FFP2/3)

Tuberculosis

Varicela

(+Contacto)



GOTAS

(Mascarilla Quirúrgica)

COVID-19

Neumonía

bacteriana

Mononucleosis

(precaución saliva)



CONTACTO

(Guantes + Bata)

Sarna

Pediculosis

Candidiasis

Tiña

Onicomycosis

Varicela (+Aire)



ESTÁNDAR

(Sangre/Fluidos)

VIH

Hepatitis B

Gonorrrea

Clamidia

Malaria

Leishmaniosis

Salmonelosis

Botulismo



La seguridad clínica comienza con la
identificación correcta del agente.