

12 Vegetationstabellen

12.1 *Carex atrofusca*-Gesellschaft

| Aufnahme-Nr. | 413 | 438A | 332 | 414 | 418 |
|---|------|------|------|------|------|
| Seehöhe (m) | 2010 | 2560 | 2150 | 2430 | 2420 |
| Exposition | E | - | W | SW | SW |
| Neigung (°) | 10 | - | 30 | 30 | 30 |
| Flächengröße (m²) | 2 | 4 | 0,25 | 4 | 1 |
| Aufnahmejahr | 2005 | 2006 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Gesamtdeckung (%) | 15 | 50 | 30 | 30 | 20 |
| AK | | | | | |
| <i>Carex atrofusca</i> | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| KK „<i>Caricetea bicoloris-atrofuscae</i>“ | | | | | |
| <i>Carex bicolor</i> | | + | | + | |
| <i>Kobresia simpliciuscula</i> | + | + | | | |
| <i>Tofieldia pusilla</i> | + | | + | | |
| Konstante Begleitarten | | | | | |
| <i>Saxifraga aizoides</i> | 1 | 3 | 1 | 2 | + |
| <i>Persicaria vivipara</i> | | 1 | 1 | 1 | + |
| Sonstige Arten | | | | | |
| <i>Carex firma</i> | | | 3 | 2 | |
| <i>Saxifraga oppositifolia</i> | | | 1 | 1 | |
| <i>Pedicularis rostrato-capitata</i> | | | + | 1 | |
| <i>Carex frigida</i> | 1 | | | | 1 |
| <i>Parnassia palustris</i> | | | | + | + |
| <i>Cratoneuron falcatum</i> | | + | | | + |
| <i>Aster bellidiastrum</i> | | | | | + |
| <i>Pinguicula alpina</i> | | | | + | |
| <i>Agrostis alpina</i> | | | | 2 | |
| <i>Salix serpyllifolia</i> | | | | 1 | |
| <i>Euphrasia salisburgensis</i> | | | | + | |
| <i>Sesleria albicans</i> | | | + | | |
| <i>Kobresia myosuroides</i> | + | | | | |
| <i>Linaria alpina</i> | | | | + | |
| <i>Festuca pumila</i> | | | | + | |
| <i>Salix retusa</i> | | | | | + |
| <i>Salix reticulata</i> | | | 3 | | |
| <i>Gentiana prostrata</i> | | | | + | |
| <i>Saxifraga caesia</i> | | | | + | |
| <i>Carex parviflora</i> | | 2 | | | |
| <i>Silene exscapa</i> | | + | | | |
| <i>Minuartia sedoides</i> | | + | | | |
| <i>Saxifraga oppositifolia</i> | | + | | | |