Folgende Arten kommen in je drei Aufnahmen vor: Carex aterima: 1, 109, 23; Trollius europaeus: 79, 108, 109; Pedicularis rostrato-capitata: 80, 132, 1; Gentiana germanica: 79, 91, 28; Taraxacum alpinum: 53, 74, 73; Draba aizoides: 107, 109, 110; Cladonia rangiferina: 107, 109, 110. Folgende Arten kommen in je zwei Aufnahmen vor: Agrostis rupestris: 98, 110; Erdflechten: 28, 23; Gentiana punctata: 108, 133; Phyteuma orbiculare: 109, 28; Oxytropis campestris: 26, 103; Alectoria ochroleuca: 1, 110; Aster bellidiastrum: 91, 92; Juncus monanthos: 78, 80; Saxifraga caesia: 79, 80; Gentiana bavarica: 100, 103; Soldanella minima: 69, 98; Soldanella pusilla: 74, 133; Veronica alpina: 98, 100; Saxifraga androsacea: 74, 73; Carduus defloratus: 52, 51; Saxifraga paniculata: 132, 1; Saussurea alpina: 132, 109; Cladonia pyxidata: 26, 107; Dianthus glacialis: 1, 22; Stereocaulon alpinum: 26, 132; Cirsium spinosissimum: 53, 131. Folgende Arten kommen in einer Aufnahme vor: Carex ferruginea: 91; Crepis aurea: 92; Deschampsia caespitosa: 79; Gnaphalium hoppeanum: 92; Horminum pyrenaicum: 92; Solorina bipsora: 80; Carex caryophyllea: 69; Hutchinsia alpina: 73; Alchemilla pentaphyllea: 131; Aster alpinus: 28, Peltigera canina: 28; Plantago alpina: 131; Primula farinosa: 28; Sibbaldia procumbens: 73; Trifolium alpinum 133; Arnica montana: 52; Hieracium alpinum: 51; Lotus alpinus: 51; Primula elatior: 51; Antennaria dioica: 109; Carex capillaris: 109; Doronicum clusii: 109; Nigritella nigra: 109; Parnassia palustris: 109; Pinguicula alpina: 109; Senecio carniolicus: 110; Viola biflora; Cladonia gracilis: 107; Draba fladnizensis: 107; Oxytropis spec. 108; Oxytropis triflora: 1; Pedicularis oederi: 5; Saponaria pumila: 107; Saxifraga bryoides: 132; Solorina saccata: 132; Callianthemum coriandrifolium: 22; Cerastium uniflorum: Doronicum glaciale: 26; Luzula lutea: 26; Sedum atratum: 22.