Primeros auxilios en casos de heridas por perforación

Las heridas por perforación provocan miedo y pueden causar conmoción o aún la muerte. Conozca cómo debe actuar con prontitud y podría salvar una vida.

Arteria braquial

(punto de presión)

En caso de perforaciones

Si la perforación es pequeña...

- Permita que la perforación sangre.
- Vende la herida.
- Verifique si necesita una inyección de refuerzo contra el tétano.

Si la herida es profunda y no para de sangrar...

- · Solicite asistencia médica.
- Utilice una venda o tela limpia para hacer presión sobre la herida.
- Mantenga presión sobre la herida con una venda en todo momento.
- Envuelva la herida con una venda y amárrela suavemente.
- Mantenga la herida arriba del nivel del corazón.
- Si la presión no detiene la hemorragia, presione la arteria que irriga el área de la herida.

Arteria femoral (punto de presión)

Objeto incrustado

Si el objeto continúa incrustado en la perforación, ino lo trate de guitar!

- · Solicite asistencia médica.
- Controle la hemorragia presionando alrededor de ella con un trapo o paño limpio.
- Si la hemorragia continua, ejerza presión sobre la arteria que irriga el área de la herida.

En caso de hemorragia severa, aplique un torniquete.

Haga esto únicamente si la hemorragia está fuera de control y la asistencia médica no está disponible inmediatamente.

- Utilice un pedazo de tela, o de cuerda, no utilice hilo o alambre.
- Envuelva dos veces la tela alrededor del miembro donde se encuentra el objeto incrustado, arriba de la herida.
- Haga un nudo con la tela.
- Inserte un palo a través del nudo y asegúrese de que el palo quede sostenido.
- Dé vueltas al palo para apretar la tela hasta que se detenga la hemorragia.
- Dé a la víctima tratamiento para conmoción.
- No intente quitar el torniquete sin asistencia médica porque podría causar la muerte.
 - Anote la hora en que se aplicó el torniquete.

