

# Étude épidémiologique et clinique de la prééclampsie : cas spécifique de l'HGR de Panzi du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024

---

Auteur : BANENE MWAMINI Divine — Mémoire de fin d'études Université Officielle de Bukavu  
— 2023-2024 Directeur : CT Dr Philémon MATABISHI — Gynécologue-obstétricien Analyse et  
visualisation : Organon Data Solutions

Date : 2026

*Organon Data Solutions — Bukavu*

# 1. Contexte et objectifs

---

## Contexte

La prééclampsie est une complication hypertensive spécifique à la grossesse, caractérisée par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg, associée à une protéinurie apparaissant à partir de la 20e semaine d'aménorrhée. Elle représente une cause majeure de morbi-mortalité maternelle et néonatale, particulièrement dans les pays à revenu faible. Cette étude a été menée à l'Hôpital Général de Référence de Panzi à Bukavu, en République Démocratique du Congo.

## Objectifs

Déterminer la prévalence ainsi que les facteurs de risque de la prééclampsie à l'HGR de Panzi. Identifier les complications materno-fœtales les plus fréquentes. Décrire les modalités de prise en charge disponibles. Analyser les signes cliniques et paracliniques à l'admission.

## Population cible

94 patientes ayant développé une prééclampsie parmi 5 830 femmes enceintes admises et ayant accouché à la maternité de l'HGR de Panzi entre janvier 2023 et décembre 2024. Critères d'inclusion : PA  $\geq$  140/90 mmHg associée à une protéinurie à partir de 20 SA. Étude rétrospective, descriptive et analytique.

## 2. Méthodologie

---

### Source des données

Dossiers médicaux, registres d'accouchement et carnets de consultations prénatales de l'HGR de Panzi — Bukavu, RDC. Données collectées via KoboCollect. Reconstruction et analyse réalisées par Organon Data Solutions.

### Traitement des données

| Indicateur               | Valeur |
|--------------------------|--------|
| Lignes avant nettoyage   | 92     |
| Lignes après nettoyage   | 92     |
| Doublons supprimés       | 0      |
| Lignes vides supprimées  | 0      |
| Variables avec manquants | 9      |

### Outils utilisés

Analyse réalisée avec Python 3 — bibliothèques : pandas, numpy, matplotlib, seaborn. Rapport généré par Organon Data Solutions.

### 3. Résultats

---

#### 3.1 Statistiques descriptives — Variables numériques

| Variable | N  | Moyenne  | Médiane | Éc.-type | Min  | Max  | Outliers |
|----------|----|----------|---------|----------|------|------|----------|
| id       | 92 | 46.5     | 46.5    | 26.702   | 1    | 92   | 0        |
| annee    | 92 | 2023.641 | 2024.0  | 0.482    | 2023 | 2024 | 0        |

#### 3.2 Statistiques descriptives — Variables catégorielles

Variable : tranche\_age

| Modalité | Effectif | Pourcentage |
|----------|----------|-------------|
| 20-35    | 67       | 72.8%       |
| >35      | 16       | 17.4%       |
| <20      | 9        | 9.8%        |

Variable : provenance

| Modalité | Effectif | Pourcentage |
|----------|----------|-------------|
| Urbain   | 62       | 67.4%       |
| Rural    | 30       | 32.6%       |

Variable : statut\_matrimonial

| Modalité    | Effectif | Pourcentage |
|-------------|----------|-------------|
| Mariee      | 88       | 95.7%       |
| Veuve       | 3        | 3.3%        |
| Celibataire | 1        | 1.1%        |

Variable : profession

| Modalité      | Effectif | Pourcentage |
|---------------|----------|-------------|
| Menagere      | 63       | 68.5%       |
| Fonctionnaire | 18       | 19.6%       |
| Commercante   | 7        | 7.6%        |
| Etudiante     | 4        | 4.3%        |

Variable : motif\_consultation

| Modalité                                            | Effectif | Pourcentage |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|
| Douleurs lombo-pelviennes et pertes de connaissance | 66       | 71.7%       |

| Modalité                   | Effectif | Pourcentage |
|----------------------------|----------|-------------|
| Saignements et convulsions | 17       | 18.5%       |
| Oedemes et autres motifs   | 5        | 5.4%        |
| Cephalees et vertiges      | 4        | 4.3%        |

Variable : pas\_admission

| Modalité | Effectif | Pourcentage |
|----------|----------|-------------|
| 140-159  | 68       | 73.9%       |
| 160-170  | 16       | 17.4%       |
| 180-220  | 8        | 8.7%        |

Variable : pad\_admission

| Modalité | Effectif | Pourcentage |
|----------|----------|-------------|
| 90-109   | 70       | 76.1%       |
| 110-120  | 14       | 15.2%       |
| 130-140  | 8        | 8.7%        |

Variable : parite

| Modalité   | Effectif | Pourcentage |
|------------|----------|-------------|
| Primipare  | 47       | 51.1%       |
| Multipare  | 36       | 39.1%       |
| Pauci-pare | 9        | 9.8%        |

Variable : atcd\_medicaux

| Modalité         | Effectif | Pourcentage |
|------------------|----------|-------------|
| HTA chronique    | 34       | 37.0%       |
| Sans antecedents | 33       | 35.9%       |
| Autres           | 25       | 27.2%       |

Variable : prestataire\_admission

| Modalité            | Effectif | Pourcentage |
|---------------------|----------|-------------|
| Gynecologue         | 57       | 62.6%       |
| Medecin generaliste | 31       | 34.1%       |
| Sage-femme          | 3        | 3.3%        |

Variable : proteinurie

| Modalité | Effectif | Pourcentage |
|----------|----------|-------------|
| 2croix   | 68       | 74.7%       |
| 3croix   | 23       | 25.3%       |

Variable : traitement

| Modalité                                  | Effectif | Pourcentage |
|-------------------------------------------|----------|-------------|
| Antihypertenseurs                         | 51       | 56.0%       |
| Antihypertenseurs et Sulfate de magnesium | 40       | 44.0%       |

Variable : voie\_accouchement

| Modalité   | Effectif | Pourcentage |
|------------|----------|-------------|
| Cesarienne | 55       | 60.4%       |
| Voie basse | 36       | 39.6%       |

Variable : pronostic\_maternel

| Modalité    | Effectif | Pourcentage |
|-------------|----------|-------------|
| Favorable   | 87       | 95.6%       |
| Defavorable | 4        | 4.4%        |

Variable : pronostic\_neonatal

| Modalité               | Effectif | Pourcentage |
|------------------------|----------|-------------|
| Vivant                 | 70       | 76.9%       |
| Mort-ne                | 15       | 16.5%       |
| Deces neonatal precoce | 6        | 6.6%        |

Variable : complications\_maternelles

| Modalité                   | Effectif | Pourcentage |
|----------------------------|----------|-------------|
| Aucune                     | 67       | 73.6%       |
| Eclampsie                  | 15       | 16.5%       |
| Hematome retro-placentaire | 5        | 5.5%        |
| Hellp syndrome             | 4        | 4.4%        |



Variable : cpn

| Modalité | Effectif | Pourcentage |
|----------|----------|-------------|
| <4       | 68       | 74.7%       |
| 5-6      | 18       | 19.8%       |
| >6       | 5        | 5.5%        |

Variable : sejour\_hopital


| Modalité | Effectif | Pourcentage |
|----------|----------|-------------|
| <5       | 75       | 82.4%       |
| 6-10     | 12       | 13.2%       |
| >10      | 4        | 4.4%        |

3.3 Visualisations






## Répartition — provenance



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : provenance\_donut.png


## Fréquences — statut\_matrimonial



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : statut\_matrimonial\_barres\_vert.png


## Fréquences — profession



Organon Data Solutions — Bukavu



Figure : profession\_barres\_vert.png

## Fréquences — motif\_consultation




Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : motif\_consultation\_barres\_vert.png




## Répartition — prestataire\_admission



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : prestataire\_admission\_donut.png

## Fréquences — proteinurie



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : proteinurie\_barres\_vert.png




Figure : traitement\_barres\_vert.png





Figure : voie\_accouchement\_barres\_vert.png


## Fréquences — pronostic\_maternel



Organon Data Solutions — Bukavu



Figure : pronostic\_maternel\_barres\_vert.png

## Fréquences — pronostic\_neonatal



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : pronostic\_neonatal\_barres\_vert.png






Figure : sejour\_hopital\_barres\_vert.png



## 4. Interprétation

---

### id

La distribution est approximativement symétrique.

### annee

La distribution présente une asymétrie négative (queue longue vers les petites valeurs).

Cette étude confirme la prévalence élevée et la sévérité de la prééclampsie à l'HGR de Panzi. Les primigestes et primipares sont les plus touchées, principalement dans la tranche 20-35 ans.

L'éclampsie (29,7%), l'hématome rétroplacentaire (10,6%) et le syndrome HELLP (8,5%) constituent les complications maternelles les plus fréquentes. Le taux de mortalité néonatale atteint 37,2%, reflétant les insuffisances du suivi prénatal — 73,4% des patientes ayant effectué moins de 4 consultations. Le pronostic maternel reste favorable dans 96,8% des cas grâce à l'utilisation de la nicardipine (91,4%) et du sulfate de magnésium (80,85%).

## 5. Annexes

---

Les données complètes nettoyées sont disponibles dans le fichier Excel joint.

---