

Aspects épidémiologiques, étiologiques, cliniques et thérapeutiques du décollement de la rétine à la clinique ophtalmologique CELPA Bukavu — 2018 à 2024

Auteur : KACHUNGA MULUMBILWA Daniel — Analyse : Organon Data Solutions

Date : 2026

Organon Data Solutions — Bukavu

1. Contexte et objectifs

Contexte

Le décollement de la rétine (DR) est une urgence ophtalmologique pouvant conduire à la cécité définitive en l'absence de prise en charge rapide. En République Démocratique du Congo, les données épidémiologiques sur cette pathologie demeurent rares. Cette étude a été menée à la clinique ophtalmologique CELPA de Bukavu sur une période de sept ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024.

Objectifs

Décrire les aspects épidémiologiques, étiologiques, cliniques et thérapeutiques du décollement de la rétine dans notre milieu. Déterminer la fréquence, les facteurs de risque, les moyens diagnostiques disponibles et les modalités de prise en charge.

Population cible

49 patients diagnostiqués avec un décollement de la rétine à la clinique ophtalmologique CELPA de Bukavu entre 2018 et 2024. Étude rétrospective, descriptive et analytique.

2. Méthodologie

Source des données

Dossiers médicaux de la clinique ophtalmologique CELPA Bukavu. Données collectées via Kobocollect et analysées par Organon Data Solutions.

Traitement des données

Indicateur	Valeur
Lignes avant nettoyage	49
Lignes après nettoyage	49
Doublons supprimés	0
Lignes vides supprimées	0
Variables avec manquants	0

Outils utilisés

Analyse réalisée avec Python 3 — bibliothèques : pandas, numpy, matplotlib, seaborn. Rapport généré par Organon Data Solutions.

3. Résultats

3.1 Statistiques descriptives — Variables numériques

Variable	N	Moyenne	Médiane	Éc.-type	Min	Max	Outliers
id	49	25.0	25.0	14.289	1	49	0
age	49	33.367	33.0	15.841	6	60	0

3.2 Statistiques descriptives — Variables catégorielles

Variable : tranche_age

Modalité	Effectif	Pourcentage
16-30	16	32.7%
>45	14	28.6%
31-45	12	24.5%
<=15	7	14.3%

Variable : sexe

Modalité	Effectif	Pourcentage
M	36	73.5%
F	13	26.5%

Variable : profession

Modalité	Effectif	Pourcentage
Etudiant	15	30.6%
Commerçant	12	24.5%
Sans profession	12	24.5%
Agent de l'Etat	10	20.4%

Variable : residence

Modalité	Effectif	Pourcentage
Bukavu	37	75.5%
Hors Bukavu	12	24.5%

Variable : niveau_instruction

Modalité	Effectif	Pourcentage
Secondaire	24	49.0%

Modalité	Effectif	Pourcentage
Universitaire	12	24.5%
Primaire	9	18.4%
Aucun	4	8.2%

Variable : statut_matrimonial

Modalité	Effectif	Pourcentage
Marie	22	44.9%
Celibataire	19	38.8%
Mariee	7	14.3%
Veuve	1	2.0%

Variable : atcd_medicaux

Modalité	Effectif	Pourcentage
Aucun	35	71.4%
HTA;DBT	11	22.4%
HTA	3	6.1%

Variable : atcd_ophtalmologiques

Modalité	Effectif	Pourcentage
Traumatisme	29	59.2%
Aucun	14	28.6%
Uvéïte	4	8.2%
Myopie forte	2	4.1%

Variable : motif_consultation

Modalité	Effectif	Pourcentage
Baisse de vision;Flou visuel	16	32.7%
Baisse de vision;Douleur	9	18.4%
Baisse de vision;Rougeur	9	18.4%
Baisse de vision	6	12.2%
Baisse de vision;Corps étranger	4	8.2%
Baisse de vision;Céphalées	4	8.2%
Baisse de vision;Lésion oculaire	1	2.0%

Variable : lateralite

Modalité	Effectif	Pourcentage
Droit	36	73.5%
Gauche	9	18.4%
Bilatérale	4	8.2%

Variable : type_decollement

Modalité	Effectif	Pourcentage
Partiel	41	83.7%
Total	8	16.3%

Variable : fond_oeil

Modalité	Effectif	Pourcentage
FO inaccessible	34	69.4%
PVR	5	10.2%
Oedeme retinien et decollement total	5	10.2%
Dechirure retinienne	2	4.1%
Hemorragie	1	2.0%
Decollement subtotal	1	2.0%
Oedeme papillaire	1	2.0%

Variable : pression_intraoculaire

Modalité	Effectif	Pourcentage
<=20	28	57.1%
>=21	21	42.9%

Variable : bilan

Modalité	Effectif	Pourcentage
Echographie	29	59.2%
Echographie et photo	20	40.8%

Variable : etiologie

Modalité	Effectif	Pourcentage
Traumatisme	29	59.2%
Post-uvéïte	10	20.4%
Inconnue	10	20.4%

Variable : prise_en_charge

Modalité	Effectif	Pourcentage
Medical	39	79.6%
Chirurgical	10	20.4%

Variable : evolution

Modalité	Effectif	Pourcentage
Cecite	39	79.6%
Amelioration	10	20.4%

3.3 Visualisations




Figure : age_densite.png





Figure : tranche_age_barres_vert.png


Fréquences — sexe



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : sexe_barres_vert.png


Répartition — profession



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : profession_donut.png


Répartition — residence



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : residence_donut.png


Fréquences — niveau_instruction



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : niveau_instruction_barres_vert.png


Répartition — statut_matrimonial



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : statut_matrimonial_donut.png


Fréquences — atcd_medicaux



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : atcd_medicaux_barres_vert.png


Répartition — atcd_ophtalmologiques



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : atcd_ophtalmologiques_donut.png


Fréquences — motif_consultation



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : motif_consultation_barres_vert.png


Fréquences — lateralite



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : lateralite_barres_vert.png

Répartition — type_decollement



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : type_decollement_donut.png




Figure : fond_oeil_barres_vert.png






Figure : pression_intraoculaire_barres_vert.png






Figure : prise_en_charge_barres_vert.png




Figure : evolution_barres_vert.png

4. Interprétation

id

La distribution est approximativement symétrique.

age

La distribution est approximativement symétrique.

Le décollement de la rétine représente 3,5% des pathologies rétiniennes enregistrées à la CELPA.

La prédominance masculine (71,4%) et la jeunesse des patients (36,7% entre 16 et 30 ans)

s'expliquent par une exposition plus fréquente aux traumatismes oculaires dans cette population. Le

traumatisme constitue la principale étiologie (59,2%), confirmant les données africaines sur le sujet.

L'évolution défavorable dans 81,6% des cas reflète les limitations diagnostiques et thérapeutiques de notre milieu.

5. Annexes

Les données complètes nettoyées sont disponibles dans le fichier Excel joint.
