

Prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans à Bukavu

Auteur : Organon Data Solutions

Date : 2026

Organon Data Solutions — Bukavu

1. Contexte et objectifs

Contexte

Le paludisme constitue l'une des principales causes de mortalité infantile en République Démocratique du Congo. Cette étude analyse sa prévalence chez les enfants de moins de 5 ans dans trois quartiers de Bukavu : Bagira, Kadutu et Ibanda.

Objectifs

Estimer la prévalence du paludisme dans la population pédiatrique de Bukavu. Identifier les facteurs associés — quartier de résidence, sexe, taux d'hémoglobine. Décrire le profil clinique des cas positifs.

Population cible

Enfants âgés de 6 à 59 mois consultés dans les centres de santé des quartiers Bagira, Kadutu et Ibanda, Bukavu — RDC.

2. Méthodologie

Source des données

Données collectées par Organon Data Solutions. Test de diagnostic rapide (TDR) utilisé comme critère de confirmation. Taille de l'échantillon : 30 patients.

Traitement des données

Indicateur	Valeur
Lignes avant nettoyage	30
Lignes après nettoyage	30
Doublons supprimés	0
Lignes vides supprimées	0
Variables avec manquants	0

Outils utilisés

Analyse réalisée avec Python 3 — bibliothèques : pandas, numpy, matplotlib, seaborn. Rapport généré par Organon Data Solutions.

3. Résultats

3.1 Statistiques descriptives — Variables numériques

Variable	N	Moyenne	Médiane	Éc.-type	Min	Max	Outliers
id	30	15.5	15.5	8.803	1	30	0
age_mois	30	28.3	27.0	15.066	6	54	0
hemoglobine	30	9.5	8.85	2.137	6.5	12.6	0

3.2 Statistiques descriptives — Variables catégorielles

Variable : sexe

Modalité	Effectif	Pourcentage
M	15	50.0%
F	15	50.0%

Variable : quartier

Modalité	Effectif	Pourcentage
Bagira	10	33.3%
Kadutu	10	33.3%
Ibanda	10	33.3%

Variable : test_tdr

Modalité	Effectif	Pourcentage
Positif	18	60.0%
Negatif	12	40.0%



Variable : resultat

Modalité	Effectif	Pourcentage
Paludisme	18	60.0%
Sain	12	40.0%


Variable : hospitalise

Modalité	Effectif	Pourcentage
Non	19	63.3%
Oui	11	36.7%

3.3 Visualisations




Répartition — quartier



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : quartier_donut.png

Fréquences — test_tdr



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : test_tdr_barres_vert.png




Figure : resultat_barres_vert.png





Figure : hemoglobine_boxplot.png


Fréquences — hospitalise



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : hospitalise_barres_vert.png

Densité — age_mois



Organon Data Solutions — Bukavu

Figure : age_mois_par_quartier_densite.png

4. Interprétation

id

La distribution est approximativement symétrique.

age_mois

La distribution est approximativement symétrique.

hemoglobine

La distribution est approximativement symétrique.

Ces résultats confirment une charge palustre élevée dans la population pédiatrique de Bukavu, cohérente avec les données épidémiologiques de la région des Grands Lacs. Une attention particulière devrait être portée au quartier de Bagira qui concentre le plus grand nombre de cas positifs.

5. Annexes

Les données complètes nettoyées sont disponibles dans le fichier Excel joint.
