



PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 1

1. OBJETIVO.

Estandarizar el procedimiento para la Limpieza y Desinfección Gestar Salud de Colombia IPS SAS. El protocolo se orienta en brindar los parámetros para prevenir las Infecciones Adquiridas en la Atención en Salud (IAAS) y las recomendaciones para realizar una buena práctica sanitaria.

2. ALCANCE.

Este protocolo es aplicable a los servicios de Gestar Salud de Colombia IPS SAS. En la actividad de limpieza y desinfección. Se define como una actividad crítica e inicia con el uso de los implementos de protección personal y termina con el lavado clínico de manos.

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA.

ÁREAS CRÍTICAS: Aquellas dónde se realizan procedimientos invasivos dónde los pacientes por su condición están más expuestos a contraer una infección y dónde se realiza el lavado de material contaminado.

ÁREAS SEMICRÍTICAS: En estas áreas los pacientes pueden permanecer largos periodos o pueden estar de manera transitoria, pueden tener contacto con elementos y mobiliario a través de la piel intacta puede o no presentarse contactos con fluidos corporales.

ÁREAS NO CRÍTICAS: En estas áreas las personas están de paso y no tienen contacto con fluido corporal.

DETERGENTE: Agente sintético utilizado para el proceso de limpieza, capaz de emulsificar la grasa. Los detergentes contienen surfactantes que no se precipitan en agua y pueden contener enzimas (proteasas/lipasas/amilasas) y blanqueadores.

DESINFECTANTE: Agente o sustancia química utilizada para inactivar prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana (ej: esporas). Su aplicación solamente está indicada sobre objetos inanimados.

DESINFECCIÓN: Es el proceso que elimina la mayoría de microorganismos patógenos y no patógenos de objetos inanimados, exceptuando las esporas, mediante el uso de agentes físicos o químicos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 2

HIPOCLORITO DE SODIO. El cloro es un desinfectante universal, activo contra todos los microorganismos. En general se utiliza en forma de hipoclorito sódico, excelente desinfectante, bactericida, virucida. Es inestable y disminuye su eficiencia en presencia de luz, calor y largo tiempo de preparación, por lo tanto, la presentación comercial indicada son envases oscuros y no transparentes.

Es ideal para remojar el material usado antes de ser lavado, e inactivar secreciones corporales por ejemplo, eliminación de heces y orina en el laboratorio.

FLUIDOS CORPORALES DE ALTO RIESGO. Se aplican siempre a la sangre y a todos los fluidos que contengan sangre visible. Se incluyen además el semen, las secreciones vaginales, el líquido cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo por constituir fuente de infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas o exposición percutánea con elementos corto punzantes contaminados con ellos. (Decreto 351 de 2014)

FLUIDOS CORPORALES DE BAJO RIESGO. Se aplican a las deposiciones, secreciones nasales, transpiración, lágrimas, orina o vómito, a no ser que contengan sangre visible caso en el cual serán considerados de alto riesgo. (Decreto 351 de 2014)

INFECCIONES ADQUIRIDAS EN ATENCIÓN EN SALUD IAAS: Infecciones padecidas por el paciente durante el ingreso en la IPS, que no estuviese presente ni en período de incubación en el momento de ingreso, siendo pues consecuencia de la asistencia en él recibida e independientemente de que aparezca los síntomas tras su alta. (Center for Disease Control, OPS, OMS)

LAVADO CLÍNICO DE MANOS: El lavado de manos clínico se realiza con agua y jabón neutro durante un tiempo entre 20 segundos hasta dos minutos y a continuación enjuague. El secado se debe realizar con toalla de papel.

Este lavado se realizará todas las veces que sea necesario. Es importante retirar todas las joyas, mantener las uñas cortas y sin esmalte.

LIMPIEZA: Es la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible (ej.: sangre, sustancias proteicas y otros residuos) presente en las superficies de los instrumentos o equipos para la salud. Es generalmente realizada con agua y detergente y debe ser iniciada inmediatamente después de la utilización de estos instrumentos o equipos.

DESINFECCIÓN: Es un proceso que elimina la mayoría o todos los

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 3

microorganismos sobre los objetos inanimados con la excepción de esporas bacterianas. Se efectúa por medio de agentes químicos, clasificados en tres categorías: Alta, intermedia y baja, según la intensidad de su acción.

ANTISÉPTICO: Sustancia aplicada en la piel u otro tejido vivo que previene o detiene el crecimiento o la acción de microorganismos por inhibición de su actividad o por su destrucción.

ESTERILIZACIÓN: Es la destrucción o eliminación completa de toda forma de vida microbiana. Puede llevarse a cabo por procesos físicos o químicos (vapor a presión, calor seco, óxido de etileno, líquidos químicos)

PARTES POR MILLÓN (PPM): Es una unidad de medida con la que se evalúa la concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia que hay por cada millón de unidades de la solución. Esta unidad es usada de una manera similar al porcentaje pero para valores o concentraciones mucho más bajos. Una concentración de 2500 ppm equivale a 0,25%. Cada 100 ml de solución contiene 0.25 gramos de hipoclorito de sodio.

PROCEDIMIENTO DE DOBLE BALDE: Es el método más común y de elección. Se realiza con el sistema de dos baldes: uno para la solución desinfectante o detergente y el otro para ir aplicando agua limpia para el enjuague. Con este método se minimiza la contaminación de las áreas. El agua que se va ensuciando no entra en contacto con el paño ya que éste se lava directamente de un suministro de agua y se acumula en el balde.

Se llenará un balde con la solución desinfectante (hipoclorito de sodio según concentración recomendada para el área a desinfectar) o detergente en cantidad suficiente para que haga espuma y otro desocupado para ir lavando el paño con un recipiente (botella o pimplina) de agua limpia.

PROCEDIMIENTO DE BALDE ÚNICO: Al utilizar este método, la solución cero (o) debe ser cambiada: 1) cuando esté sucia, aunque no se haya finalizado de limpiar el área, y 2) antes de pasar a otra área.

En principio se realizará la limpieza con la solución de detergente

Se enjuaga luego con el agua limpia y se secará.

Finalmente se realizará la desinfección con solución de hipoclorito de sodio según concentración recomendada para el área a desinfectar. Se deja actuar y se retira con agua.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 4

SOLUCIÓN: Combinación de un sólido o de un producto concentrado con agua, para obtener una distribución homogénea de cada uno de los componentes.

TIPOS DE SUCIEDAD

Suciedad pigmentaria como el (Hollín, polvo, arenillas). El polvo es un conjunto de micro partículas disgregadas que se pueden encontrar, cubriendo el suelo o en suspensión en el aire, depositando sobre los objetos.

El polvo se elimina fácilmente por barrido húmedo o por aspiración, pero nunca por barrido seco, ya que lo único que se consigue es poner las pequeñas partículas en movimiento y éstas pueden llegar a estar en suspensión en el aire hasta 7 horas, depositándose otra vez en el mismo sitio o en diferente lugar. Si limpiamos superficies con productos como las ceras (que tienen gran poder de acumulación de electricidad estática), el problema aumentaría, pues estas micropartículas que estaban en suspensión acabarían pegándose a muebles y superficies.

Suciedad grasa: La produce todas las materias que contienen aceites y grasas. En muchos casos la alcalinidad fija la grasa si no es saponificable. Para este caso se usan desengrasantes (Tensoactivos).

Suciedad biológica: Son las producidas por manchas de sangre, albúmina, sudor etc. Las suciedades de origen biológico se fijan en seco, siendo muy difícil su eliminación.

Suciedad coloreada: Mayoritariamente la producen materias pigmentarias. La mayor parte se fija en los textiles, siendo muy difícil su eliminación.

Suciedades conteniendo óxidos metálicos: Las producen los óxidos de hierro, cobre, plata, bronce, etc., no suelen ser muy numerosas, particularmente se producen por oxidación al roce con materiales metálicos. En seco no se quitan, se fijan. En mojado desaparecen tratando la mancha con productos ácidos como el clorhídrico.

Suciedades producidas por microorganismos: Hongos y bacterias.

DESINFECTANTES Y TIPO.

Glutaraldehído: Su utilización al 2 % en solución buffer o reguladora hacen de este producto uno de los más potentes desinfectantes, con capacidad para

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 5

destruir esporas. Previamente a su empleo hay que proceder a activar la solución, lo que consiste en alcalinizar el producto hasta un pH de 7.5 – 8.5, el periodo de estabilidad de esta mezcla es de un mes.

En su utilización como desinfectante puede diluirse la solución activada al 1:16 o 1:30 en agua, en función de si sospecha o no la presencia del virus del SIDA o hepatitis B, y dejar dentro el material durante de 20 minutos, si se utiliza como esterilizante no se diluirá y el material debe deberá quedar sumergido durante 6 horas y 45 minutos. No es corrosivo y mantiene su actividad en presencia de materia orgánica. Puede provocar irritación de la piel en caso de contacto y de los ojos si el cubículo o habitación no está bien ventilada

Alcoholes:

Como desinfectante se utilizan dos compuestos, el alcohol etílico y el alcohol isopropílico Una condición particular del etanol es que sí se usa como antiséptico en una solución pura, al 100%, carece casi por completo de acción germicida. Esto se debe a que el etanol actúa precipitando las proteínas del germen exclusivamente en medio acuoso. El alcohol debe estar diluido para tener efecto. El etanol 70% es un desinfectante de nivel intermedio. Es letal para Bacterias incluyendo el bacilo de Koch, es un irregular fungicida y viricida, y no actúa sobre las esporas. El alcohol etílico tiene un uso limitado, particularmente como antiséptico profiláctico en la piel previo a la introducción de agujas. Sin embargo, para obtener los resultados germicidas esperados, deberíamos esperar 2 minutos como mínimo (latencia de acción). El alcohol es un buen antiséptico pero no es el mejor.

Peróxido de hidrógeno:

Tiene escaso poder, pero libera oxígeno molecular al entrar en contacto con los tejidos, posee cierta utilidad en la eliminación de restos orgánicos y de sangre, pero teniendo en cuenta que después de utilizar este producto, los elementos deben de ser sometidos a una desinfección más energética.

Povidona Yodada:

Es un bacteriostático o bactericida dependiendo de la concentración utilizada. Las diluciones son poco estables y pierden su actividad antiséptica con rapidez, en condiciones normales no se absorben, pero su uso repetido puede producir reacciones alérgicas.

NIVELES DE DESINFECCIÓN

Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los microorganismos y pueden ser:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 6

Desinfección de alto nivel (DAN): Es realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los microorganismos. Como ejemplos: el orthophthaldehído, el glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído, entre otros.

Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida y el cloruro de benzalconio. Ver protocolo de uso y preparación del hipoclorito de sodio en INSNECOR

Desinfección de bajo nivel (DBN): Es realizada por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo corto (menos de 10 minutos). Como por ejemplo, el grupo de amonios cuaternarios.

CRITERIOS DE INDICACIÓN PARA LA DESINFECCIÓN

Artículos críticos: Son aquellos instrumentos que entran en contacto con cavidades o tejidos estériles incluyendo el sistema vascular. Estos artículos representan un alto riesgo de infección si están contaminados con cualquier microorganismo por lo que deben ser siempre estériles. Por ejemplo, pinzas y los catéteres

Artículos semicríticos: Son aquellos instrumentos que entran en contacto con la mucosa de los tractos respiratorios, genitales y urinarios, y con la piel que no se encuentra intacta. Aunque las mucosas son generalmente resistentes a las infecciones por esporas bacterianas, pueden presentar infección cuando se contaminan con otras formas microbianas. Por tal razón deben ser estériles, o bien mínimamente, deben ser sometidos a Desinfección de Alto Nivel (DAN). Por ejemplo, los equipos de asistencia respiratoria,

Artículos no críticos: como todos aquellos que sólo toman contacto con la piel intacta, en este caso, la piel sana actúa como una barrera efectiva para evitar el ingreso de la mayoría de los microorganismos y por lo tanto el nivel de desinfección requiere ser menor. En general, sólo exige limpieza adecuada, secado y desinfección de nivel intermedio o de bajo nivel. Como ejemplo podemos citar la ropa de cama, las incubadoras, los colchones y los muebles en general.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS: Ver Protocolo de uso y preparación de hipoclorito de sodio en Gestar Salud de Colombia IPS SAS.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 7

TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS

TIPOS DE LIMPIEZA: Se diferencian dos tipos de limpieza:

Rutinaria: es aquella que se realiza en forma diaria o entre paciente y paciente o entre procedimientos (Ej. Radiología, urgencias)

Terminal: Es aquella que se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa incluyendo sistemas de ventilación, iluminación y almacenamientos, máximo una vez a la semana o si las condiciones del área lo ameritan se realiza antes del tiempo programado y al alta del paciente.

La técnica a emplear para la limpieza y desinfección de superficies planas es la de arrastre.

Consiste siempre en limpiar de arriba hacia abajo y en el techo en un solo sentido, evitando repetir el paso del paño varias veces por el mismo sitio. Es importante hacer énfasis en esquinas y grietas en donde puede quedar acumulada la suciedad.

Para la manipulación de la máquinas aplicar la técnica de zig-zag.

Las máquinas se deben operar de la parte donde está conectada hacia adelante como indica la gráfica y en forma de zig-zag.

Para la limpieza de pisos la técnica del ocho.

El número y tipo de microorganismos presentes en las superficies ambientales se ven afectados por los siguientes factores:

El número de personas en el ambiente

La cantidad de actividad

La cantidad de humedad

La presencia de material capaz de promover crecimiento microbiano

El tipo de superficie y su orientación (horizontal o vertical)

Las estrategias para la limpieza y desinfección de superficies en áreas de cuidado de pacientes tienen en cuenta:

El potencial de contacto directo con el paciente

El grado de frecuencia de contacto con las manos y

El potencial de contaminación de la superficie ambiental con secreciones corporales o fuentes ambientales de microorganismos (Ej., suelo, polvo y agua).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 8

INDICACIONES INICIALES PARA LA LABOR DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS

Los procesos de limpieza se realizan antes que la desinfección. Las superficies ambientales se dividen en dos grupos:

Aquellas que suponen un contacto mínimo con las manos (Ej. los techos y los pisos).

Aquellas que están sometidas a un contacto frecuente con las manos (las superficies de alto contacto Ej. Las perillas de las puertas, las camas, interruptores de la luz, áreas de la pared alrededor del baño y en la habitación del paciente, los bordes de las cortinas etc.), deben ser limpiadas y desinfectadas con más frecuencia que las superficies que tienen un contacto mínimo con las manos.

Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar al finalizar la labor. Utilizar los elementos de protección personal.

Para el lavado rutinario emplear un paño húmedo para limpiar las paredes, los suelos y las otras superficies en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo realizar previamente humedad.

Lavar las superficies de arriba para abajo para que la suciedad caiga al suelo y sea lo último de recoger (técnica arrastre). Limpiar primero las instalaciones que sean más altas y de ahí, seguir limpiando hacia abajo - por ejemplo, se debe limpiar primero las lámparas del techo, después las mesas, luego los estantes, y como último, el piso. Utilice un paño de limpieza diferente para las superficies frecuentemente tocadas y por ende con mayor probabilidad de estar contaminadas. (dos paños).

Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder controlar la contaminación de bacterias.

Hacer la remoción mecánica entregando y friccionando las superficies.
Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza.

No utilizar escobas para evitar dispersar el polvo presente. Hacer uso de una mopa. Las soluciones en balde se pueden contaminar casi inmediatamente durante la limpieza, y al continuar usando la solución se transfieren numerosos microorganismos en cada superficie subsiguiente limpiada, por lo que las

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 9

soluciones de limpieza deben reemplazarse con frecuencia. Una variedad de métodos "de uso del balde", se han diseñado para determinar la frecuencia con la cual se deben reemplazar las soluciones de limpieza. En el caso específico del lavado de ambulancias se emplea la técnica del doble balde.

Otra fuente de contaminación en el proceso es la limpieza con paños o con la cabeza del traperero, cuando estos implementos se han dejado humedecer en soluciones de limpieza sucias, se recomienda:

Lavar y desinfectar los paños y cabezas de traperos después de usarse y permitir su secado manteniéndolos colgados en un perchero con la mecha hacia abajo antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a minimizar el grado de contaminación cruzada.

Preparar la cantidad necesaria de solución de limpieza para el aseo diario, (según cantidad de superficies y duración o estabilidad de la preparación).

Descartar residuos de solución que no se alcance a consumir en el periodo de viabilidad de uso.

Lavar, desinfectar y secar el contenedor utilizado para preparar la solución de limpieza con detergente líquido, enjuagar con agua y desinfectar con el desinfectante de nivel intermedio/bajo en uso para minimizar el grado de contaminación bacteriana.

El uso de atomizadores con pistola se pueden utilizar para aplicar detergentes y desinfectantes en las superficies y luego limpiar con paños que generen mínimo aerosol, también se puede aplicar directamente al paño y luego a la superficie. También se pueden utilizar soluciones dos en uno de detergente/ desinfectante listas para utilizar.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Está dirigido a todas las Sedes de IPS GESTAR SALUD DE COLOMBIA IPS SAS.

4. RESPONSABLE.

- Personal de limpieza y desinfección

5. MATERIALES Y EQUIPO

- Elementos de protección personal.
- Utensilios de limpieza y desinfección

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 10

6. INDICACIONES

- Todas las áreas y sedes que se encuentren habilitadas en GESTAR SALUD DE COLOMBIA IPS SAS.

7. PRECAUCIONES

- Se debe cumplir cabalmente las instrucciones del protocolo, utilización de EPP y fichas técnicas de los productos.

8. MECANISMOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN.

- Seguimiento al en el formato de limpieza y desinfección

9. REFERENCIAS.

- Ministerio de la Protección Social.

10. ANEXOS.

- No aplica.

11. FORMATOS.

- FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

11. ACTUALIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Leidys Guzmán Montes	Leidys Guzmán Montes	Paola Hernández
Coord. SIG	Coord. SIG	Gerente
		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT01	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 11

12. CONTROL DE LOS CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1	Versión inicial del Sistema Integrado de Gestión.	01/09/2018
2	Actualización Versión del Sistema Integrado de Gestión.	31/01/2022