

9주차 - 1차시	청소년 우울
------------------	---------------

1. 청소년 우울의 정의와 실태

1) 우울의 정의

◆ 사회복지협의회 사전

- 우울은 의기 상실한 기분으로 정신운동 저하, 불면증, 체중 감소를 수반한 정신적 증후군을 말함

◆ 미국 전국사회복지사협회 사전

- 우울은 슬픈 것, 절망에 빠져 자신을 포기하는 것, 미래에 대해 비관적인 것, 활동과 생산성이 줄어드는 것, 자는 데 어려움을 겪는 것, 심하게 피곤한 것, 자신을 미워하는 것의 특징을 지니는 감정적인 반응을 말함

◆ 미국 정신의학학회

- 우울은 느끼는 방식, 생각하는 방식, 행동하는 방식에 부정적으로 영향을 미치는 일반적이고 심각한 의학적 질병을 말함

※ 종합하면, 우울은 생활에 대해 부정적으로 인식하는 탓에 느끼고 생각하고 행동하는 데 크게 어려움을 겪는 마음 상태라고 볼 수 있음

2) 청소년 우울의 실태

◆ 청소년의 우울감 경험률

- 남학생
 - 22.4%가 경험함
- 여학생
 - 31.4%가 경험함

※ 이전 년도 대비 남학생은 2.3%p, 여학생은 0.7%p 우울감 경험률이 증가함

- 전반적으로 여학생의 우울감 경험률이 남학생보다 높았음

(출처) 2022 청소년백서

2. 청소년 우울의 유발요인과 증상

1) 청소년 우울의 유발요인

◆ 일반적 요인

- 자신을 가치 있는 존재로 인식하는 데 부정적으로 영향을 미치는 상태에 놓여 있음
- 특히 우리나라에서 공부와 관련된 스트레스는 우울과 크게 관련되고 있음
(예) · 몸이 비만한 상태에 있음
 - 친구와의 관계에서 어려움을 겪고 있음
 - 오랫동안 괴롭힘을 당하고 있음
 - 학습과 관련해 어려움을 겪고 있음
- 우울 이외의 다른 정신건강문제를 겪고 있음
(예) · 불안 장애
 - 성격 장애
- 어린 아동기에 마음의 상처를 주는 사건을 겪음
(예) · 신체적 학대를 겪음
 - 정서적 학대를 겪음
 - 부모와 이별함
- 계속해서 고통스러운 상태에 있거나 또는 고치기 힘든 신체적 질병을 겪고 있음
(예) 암이나 당뇨나 천식으로 어려움을 겪는 것이 있음
- 알코올이나 담배나 기타 약물을 잘못 사용하고 있음
- 동성애를 좋지 않게 보는 사회적 분위기에서 동성애자로 살고 있음

◆ 가족과 관련된 요인

- 부모나 조부모나 기타 친척이 우울이나 기타 문제를 겪은 적이 있음
- 가족구성원이 자살로 사망한 적이 있음
- 가족이 역할을 제대로 하지 못하고 있으며, 가족구성원들 사이에 갈등하고 있음

- 가족과 관련해 최근에 스트레스를 주는 사건을 겪은 적이 있음
(예) · 부모의 이혼
 · 가족구성원의 사망

2) 청소년 우울의 증상

◆ 청소년 우울을 보여주는 증상

- 슬퍼함
- 사소한 문제에 대해서조차도 좌절하거나 분노함
- 흥분하거나 들떠 있음
(예) · 왔다 갔다 하는 것
 · 가만히 앉아 있지 못함
- 희망이 없다고 느끼거나, 허무하다고 느끼고 있음
- 거절당한 것이나 실패한 것에 대해 너무 민감하게 반응함
- 자신을 가치 있는 존재로 생각하지 않음
- 삶과 미래에 대해 항상 부정적으로 인식하고 있음
- 일상 활동에 대해 관심을 가지지 않거나, 일상 활동에서 즐거움을 느끼지 못함
- 가족과 친구에 대해 관심을 가지지 않거나, 가족이나 친구와의 관계가 좋지 않음
- 사회적으로 고립되어 지내고 있음
- 학교 성적이 좋지 않거나, 학교를 자주 결석함
- 생각하고 집중하고 결정을 내리고 기억하는 데 어려움을 겪음
- 잠자는 데 어려움을 겪거나, 너무 많이 잠
- 식욕이 변함
(예) · 식욕이 줄어들어서 몸무게가 줄어듦
 · 식욕이 늘어나서 몸무게가 늘
- 특별한 이유가 없이 몸과 머리가 아프다고 자주 불평함
- 개인의 위생이나 외모에 대해 신경을 덜 씀
- 분노를 밖으로 갑자기 드러내거나, 위험한 행동을 함
- 알코올이나 기타 약물을 사용함

- 자신을 해침
(예) · 자신의 신체에 상처를 입히거나, 화상을 입힘
· 자신의 신체에 과도하게 문신함
- 죽음이나 자살하는 것에 대해 자주 생각함

◆ 고려할 점

- 우울은 살아가면서 어느 때고 나타날 수 있음
- 청소년에게 나타나는 우울 증상과 성인에게 나타나는 우울 증상은 서로 다를 수 있음
- 청소년의 우울 증상은 우울의 심각함 정도에 따라 차이가 날 수 있음
- 청소년의 우울은 불안과 관련될 수 있음
- 우울을 겪는 청소년은 우울을 겪는 성인에 비하여 불안감, 사회의 가치에 어긋나는 행동, 성격 장애를 가지는 경우가 더 많음

3) 청소년 우울이 미치는 영향

◆ 청소년에게 미치는 영향

- 청소년에게 정서적 문제와 신체적 문제를 유발할 가능성이 큼
- 청소년이 생각하고 느끼고 행동하는 방식에 영향을 미침
⇒ 사회적 영역과 교육적 영역에서 부정적으로 영향을 미칠 수 있음
- 청소년 자살을 유발하는 주요한 요인이 되고 있음
- 청소년이 제 역할을 하는 데 어려움을 유발할 수 있음
- 심각하고 지속적인 우울은 청소년의 모든 생활 영역에서 부정적으로 영향을 미칠 수 있음

◆ 청소년의 가족에게 미치는 영향

- 청소년 우울 때문에 청소년의 신체적 건강과 정신건강이 좋지 않게 될 경우
→ 청소년의 부모와 기타 가족구성원은 청소년의 불안정한 정서 때문에 크게 민감해질 가능성이 큼
- 청소년의 가족이 제 역할을 하는 데 부정적으로 영향을 미칠 가능성이 큼
- 청소년이 우울 때문에 자살을 시도하거나 자살할 경우 → 청소년의 부모와 기타 가족구성원은 엄청난 고통을 겪게 됨

◆ 사회와 국가에 미치는 영향

- 청소년이 우울한 상태에 있을 경우 → 청소년은 위험한 행동을 하거나 사회의 가치에 어긋나는 행동을 할 수 있음 → 사회와 국가는 청소년 우울 때문에 피해를 볼 수 있음
- 청소년 우울로 촉발된 문제에 대처하기 위해, 사회와 국가가 비용을 부담하는 상황을 맞이하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있음

3. 청소년 우울의 치료와 보호방안

1) 청소년 우울의 치료

◆ 치료의 필요성

- 청소년이 우울을 치료하지 않을 경우, 정서, 행동, 건강 등과 관련된 영역에서 어려움을 겪을 수 있음
- 청소년이 겪는 우울 증상은 시간이 지남다고 해서 저절로 줄어들지 않을 수 있음
- 청소년이 우울을 치료하지 않을 경우, 우울 증상이 더 심해지거나 다른 문제가 나타날 수도 있음

※ 청소년이 우울한 상태에있는 것으로 진단될 경우, 청소년 우울에 대해 치료할 필요가 있음

◆ 치료 방법

① 심리 치료(Psychotherapy)

- 인지의 경우 비합리적인 신념을 합리적 신념으로 바꾸기 위해 노력해야 함
- 행동의 경우 적응적 행동을 시도함
(예) 인지행동치료

② 약물 치료(Pharmacotherapy)

- 심리 치료를 이용할 수 없거나 또는 심리 치료를 적용할 수 없을 경우, 약물 치료를 대신 사용함

③ 심리 치료와 약물 치료를 함께 사용하는 치료

- 청소년 우울을 치료하는 방법을 선택할 때에는 여러 가지 측면을 고려할 필요가 있음

- 우울 상태가 심각한 정도
- 청소년과 가족이 원하는 방법
- 우울을 유발한 것으로 보이는 요인
- 가족이 청소년을 지지해 주는 정도
- 각각의 치료 방법을 이용할 수 있는 정도

◆ 고려할 점

- 우선적으로 심리치료가 필요한 청소년을 파악해야 함
 - 우선적으로 심리치료를 고려해야할 청소년의 상태
 - ▶ 약물을 사용하는 것을 두려워하고 있음
 - ▶ 스트레스를 유발한 요인을 잘 알고 있음
 - ▶ 다른 치료 방법은 효과적이지 않음
- 우울은 빨리 치료하는 것이 중요함
- 청소년이 우울할 가능성을 보여 주는 상황을 맞이할 경우, 빨리 치료를 받을 필요가 있음
- 우울은 짧은 기간에 완전하게 치료되기가 어려운 경우가 많으며, 꾸준히 치료할 필요가 있음

2) 청소년의 우울문제에 대한 보호 방안

◆ 일반적 방안

① 예방 측면에의 주목

- 청소년 우울에 대해서 중요한 것은 청소년이 심각한 우울을 처음부터 겪지 않도록 하는 것임
 - ▶ 스트레스를 잘 관리하게 함
 - ▶ 어려움을 겪고 나서 다시 원래대로 돌아갈 수 있는 능력을 키우게 함
 - ▶ 자신을 가치 있는 존재로 생각하게 함

② 사회적 지지의 제공

- 여러 수준에서 청소년에게 제공하는 사회적 지지는 청소년 우울과 관련된 문제를 줄이거나 없애는 데 도움을 줄 수 있음
- 청소년의 가정과 학교와 지역사회에서는 우울한 청소년을 지지해 주는 데 적극적으로 관여할 필요가 있음