

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 87 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 มีค 66 จาก 33 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.13 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.89 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.99 %) 25-34 ปี (20.69 %) 10-14 ปี (19.54 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.6 ลาวร้อยละ 1.1 พม่าร้อยละ 1.1 กัมพูชาร้อยละ 1.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 48.3 รับจ้างร้อยละ 20.7 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 16.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (8 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย), 10-14 ปี (1 ราย), 6 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 7-9 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8 ราย), 15-24 ปี (4 ราย), 10-14 ปี (4 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region 2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health