

## D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 238 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 พค 67 จาก 57 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.36 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 18 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.20 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.47 %) 10-14 ปี (15.55 %) 25-34 ปี (15.13 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.4 พม่าร้อยละ 2.1 อื่นๆร้อยละ 1.7 ลาวร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 36.6 นักเรียนร้อยละ 31.9 รับจ้างร้อยละ 17.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (16 ราย), 15-24 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (15 ราย), 10-14 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (6 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8 ราย), 15-24 ปี (7 ราย), 35-44 ปี (4 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (26 ราย), 25-34 ปี (10 ราย), 10-14 ปี (10 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

□0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2567

