

## D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 226 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 11 พค 67 จาก 54 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.34 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 17 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.11 %) 10-14 ปี (15.49 %) 25-34 ปี (15.04 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.0 พม่าร้อยละ 1.8 อื่นๆร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 36.7 นักเรียนร้อยละ 32.3 รับจ้างร้อยละ 16.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (15 ราย), 10-14 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออก/เฉิงเหื้อ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (14 ราย), 10-14 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 25-34 ปี (6 ราย), 35-44 ปี (4 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (23 ราย), 10-14 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (9 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2567

