

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 251 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 1 มิย 66 จาก 47 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.38 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.98 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.10 %) 10-14 ปี (20.32 %) 25-34 ปี (19.52 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.2 พม่าร้อยละ 1.2 กัมพูชาร้อยละ 1.2 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 49.8 รับจ้างร้อยละ 22.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 11.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (25 ราย), 10-14 ปี (25 ราย), 25-34 ปี (25 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (9 ราย), 10-14 ปี (4 ราย), 35-44 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (7 ราย), 35-44 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (22 ราย), 25-34 ปี (20 ราย), 10-14 ปี (20 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

