รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 3 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 4 มค 66 จาก 3 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.00 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 2.00 กลุ่ม อายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี (66.67 %) 55-64 ปี (33.33 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ นัก เรียนร้อยละ 66.7 รับจ้างร้อยละ 33.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ







[©] Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health