

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 1201 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 9 ธค 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.81 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 102 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.15 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.06 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.31 %) 10-14 ปี (19.65 %) 25-34 ปี (14.90 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.5 พม่าร้อยละ 2.7 กัมพูชาร้อยละ 0.8 อื่นๆร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 46.4 รับจ้างร้อยละ 26.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 11.4


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (142 ราย), 10-14 ปี (96 ราย), 25-34 ปี (90 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (73 ราย), 15-24 ปี (47 ราย), 7-9 ปี (17 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (34 ราย), 25-34 ปี (27 ราย), 35-44 ปี (20 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (69 ราย), 25-34 ปี (50 ราย), 10-14 ปี (48 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

