

## D.H.F.shock syndrome

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 37 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 2 กพ 66 จาก 19 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.06 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.76 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี (24.32 %) 15-24 ปี (24.32 %) 55-64 ปี (18.92 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3 ลาวร้อยละ 2.7 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 35.1 รับจ้างร้อยละ 32.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 16.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (7 ราย), 15-24 ปี (7 ราย), 10-14 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 9-11 เดือน (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (2 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health