

D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 208 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 เมย 67 จาก 52 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.31 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 14 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.17 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (27.40 %) 25-34 ปี (15.38 %) 10-14 ปี (15.38 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.6 พม่าร้อยละ 1.4 อื่นๆร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 35.6 นักเรียนร้อยละ 32.7 รับจ้างร้อยละ 16.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 10-14 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (12 ราย), 10-14 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 25-34 ปี (6 ราย), 10-14 ปี (3 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (23 ราย), 25-34 ปี (8 ราย), 10-14 ปี (7 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2567

