

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 1110 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 13 พย 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.68 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 90 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.14 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.05 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.05 %) 10-14 ปี (20.09 %) 25-34 ปี (15.95 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.5 พม่าร้อยละ 2.9 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.5 อื่นๆร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.4 รับจ้างร้อยละ 27.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.0


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง Mukdahan อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (140 ราย), 25-34 ปี (93 ราย), 10-14 ปี (91 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (68 ราย), 15-24 ปี (45 ราย), 7-9 ปี (16 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (32 ราย), 25-34 ปี (26 ราย), 55-64 ปี (20 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (61 ราย), 25-34 ปี (48 ราย), 10-14 ปี (46 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

