

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 477 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 6 สค 66 จาก 60 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.72 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 30 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.05 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.16 %) 10-14 ปี (20.34 %) 25-34 ปี (15.93 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.6 พม่าร้อยละ 2.7 อื่นๆร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 48.0 รับจ้างร้อยละ 27.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (58 ราย), 10-14 ปี (42 ราย), 25-34 ปี (40 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (26 ราย), 15-24 ปี (15 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (14 ราย), 25-34 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (9 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (33 ราย), 10-14 ปี (23 ราย), 25-34 ปี (19 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

