

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค **D.H.F.shock syndrome** พบผู้ป่วย **145** ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 เมย 66 จาก 38 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย **0.22** ต่อแสนประชากร เสียชีวิต **6** ราย คิดเป็นอัตราตาย **0.01** ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง **1: 0.99** กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (**22.76 %**) 10-14 ปี (**21.38 %**) 25-34 ปี (**20.69 %**) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.9 กัมพูชาร้อยละ 2.1 พม่าร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 0.7 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 52.4 รับจ้างร้อยละ 20.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 11.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (20 ราย), 15-24 ปี (17 ราย), 25-34 ปี (15 ราย),
- ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 10-14 ปี (1 ราย), 6 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (5 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (12 ราย), 10-14 ปี (8 ราย), 15-24 ปี (5 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region
2566

