

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 820 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 กย 66 จาก 72 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.24 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 60 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.09 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.06 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.51 %) 10-14 ปี (20.49 %) 25-34 ปี (14.88 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.7 พม่าร้อยละ 2.7 กัมพูชาร้อยละ 0.7 อื่นๆร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.2 รับจ้างร้อยละ 27.9 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.2


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง อุดรดิตถ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (106 ราย), 10-14 ปี (66 ราย), 25-34 ปี (65 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (57 ราย), 15-24 ปี (31 ราย), 35-44 ปี (11 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (23 ราย), 25-34 ปี (17 ราย), 55-64 ปี (17 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (41 ราย), 25-34 ปี (32 ราย), 10-14 ปี (32 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

