

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 1221 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 16 ธค 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.85 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 104 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.16 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.07 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.49 %) 10-14 ปี (19.49 %) 25-34 ปี (14.82 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.5 พม่าร้อยละ 2.6 กัมพูชาร้อยละ 0.8 อื่นๆร้อยละ 0.7 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 46.3 รับจ้างร้อยละ 26.8 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 11.8


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (147 ราย), 10-14 ปี (98 ราย), 25-34 ปี (92 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (73 ราย), 15-24 ปี (48 ราย), 7-9 ปี (17 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (34 ราย), 25-34 ปี (27 ราย), 35-44 ปี (20 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (70 ราย), 25-34 ปี (50 ราย), 10-14 ปี (48 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio  
2566

