
D.H.F.

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 38669 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 58.44 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 50 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.35 %) 25-34 ปี (15.90 %) 10-14 ปี (15.32 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.8 อื่น ๆร้อยละ 2.3 พม่าร้อยละ 2.0 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ได้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.6 รับจ้างร้อยละ 23.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 20.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3059 ราย), 25-34 ปี (2244 ราย), 10-14 ปี (1802 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 15-24 ปี (1931 ราย), 10-14 ปี (1751 ราย),
 25-34 ปี (880 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1622 ราย), 15-24 ปี (1432 ราย), 35-44 ปี (1077 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2222 ราย), 10-14 ปี (1612 ราย), 25-34 ปี (1404 ราย),



Number of D.H.F. cases by week of onset and region.

