

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 76 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 6 มีค 66 จาก 30 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.11 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.85 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.00 %) 25-34 ปี (21.05 %) 10-14 ปี (18.42 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.4 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 1.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักรับหรือร้อยละ 46.1 รับจ้างร้อยละ 22.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 14.5


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (10 ราย), 15-24 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 10-14 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 7-9 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (7 ราย), 15-24 ปี (4 ราย), 2 ปี (3 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health