

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 381 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 16 กค 66 จาก 62 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.58 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 22 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.97 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.98 %) 10-14 ปี (19.69 %) 25-34 ปี (16.80 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.9 พม่าร้อยละ 1.6 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.5 อื่นๆร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 48.3 รับจ้างร้อยละ 26.5 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 10.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (44 ราย), 25-34 ปี (35 ราย), 10-14 ปี (33 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 10-14 ปี (16 ราย), 35-44 ปี (6 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (11 ราย), 25-34 ปี (7 ราย), 35-44 ปี (5 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (28 ราย), 10-14 ปี (22 ราย), 25-34 ปี (17 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

