

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 1043 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 27 ตค 66 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.58 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 82 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.12 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.74 %) 10-14 ปี (20.52 %) 25-34 ปี (15.53 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.6 พม่าร้อยละ 2.8 กัมพูชาร้อยละ 0.9 ลาวร้อยละ 0.4 อื่นๆร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.5 รับจ้างร้อยละ 27.8 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 9.7


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (130 ราย), 10-14 ปี (87 ราย), 25-34 ปี (82 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (67 ราย), 15-24 ปี (42 ราย), 7-9 ปี (15 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (30 ราย), 25-34 ปี (24 ราย), 55-64 ปี (20 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (56 ราย), 25-34 ปี (46 ราย), 10-14 ปี (43 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

