ร้อยละ 22.0

Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4093 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 2 กย 66 จาก 57 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.19 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.56 กลุ่มอายุที่พบมาก ที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.09 %) 25-34 ปี (16.91 %) 35-44 ปี (14.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.4 พม่าร้อยละ 20.5 อื่น ๆร้อยละ 5.9 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 28.0 รับจ้างร้อยละ 26.0 เกษตร

Malaria

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (275 ราย), 25-34 ปี (224 ราย), 35-44 ปี (223 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
 25-34 ปี (9 ราย), 15-24 ปี (4 ราย), 55-64 ปี
 (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (606 ราย), 25-34 ปี (392 ราย), 10-14 ปี (285 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (75 ราย),
 45-54 ปี (69 ราย), 25-34 ปี (67 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0 □ 0.01-10 □ >10-50 □ >50-100 □ >100-500 □ >500

| | • | | riara | ina cases | 2566 | CCR OF OTISC | c ana | regioni |
|---|-----|------------|--------|-----------|------|--------------|-------|---------|
| Š | 12: | 34 56789L0 | 112841 | 562892022 | _ | 00118367699 | | |
| | - | North | - | Central | - | Northeast | _ | South |

Number of Malaria cases by week of onset and region.

| ชนิดของเชื้อ/สาร | จำนวน | ร้อย ละ |
|----------------------------|-------|------------|
| PF : Plasmodium falciparum | 70 | 1.7 |
| PV : Plasmodium vivax | 2419 | 59.1 |
| PM : Plasmodium malariae | 40 | 1.0 |
| Mixed type | 6 | 0.1 |
| Unknown | 1558 | 38.1 |

[©] Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health