

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 272 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 11 มิย 66 จาก 49 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.41 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 11 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.99 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.47 %) 10-14 ปี (19.85 %) 25-34 ปี (19.12 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.7 มลายูร้อยละ 1.1 กัมพูชาร้อยละ 1.1 อื่นๆร้อยละ 0.7 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 50.7 รับจ้างร้อยละ 23.2 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 10.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (28 ราย), 15-24 ปี (28 ราย), 10-14 ปี (25 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10 ราย), 10-14 ปี (6 ราย), 35-44 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (7 ราย), 10-14 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (27 ราย), 10-14 ปี (21 ราย), 25-34 ปี (20 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

