

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 521 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 12 สค 66 จาก 66 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.79 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 36 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.05 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.06 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.57 %) 10-14 ปี (20.73 %) 25-34 ปี (15.16 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.2 พม่าร้อยละ 2.3 กัมพูชาร้อยละ 0.6 อื่นๆร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 47.8 รับจ้างร้อยละ 27.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 10.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (59 ราย), 10-14 ปี (43 ราย), 25-34 ปี (40 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (32 ราย), 15-24 ปี (22 ราย), 35-44 ปี (8 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (14 ราย), 25-34 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (9 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (33 ราย), 10-14 ปี (25 ราย), 25-34 ปี (21 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

