

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 227 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 พค 66 จาก 45 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.34 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.99 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.23 %) 25-34 ปี (20.26 %) 10-14 ปี (19.82 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.9 พม่าร้อยละ 1.3 กัมพูชาร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 49.3 รับจ้างร้อยละ 22.5 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 12.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (24 ราย), 15-24 ปี (23 ราย), 10-14 ปี (23 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (9 ราย), 10-14 ปี (4 ราย), 35-44 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 10-14 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (18 ราย), 15-24 ปี (17 ราย), 10-14 ปี (16 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

