

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 63 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 กพ 66 จาก 26 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.10 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.85 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.22 %) 10-14 ปี (20.63 %) 25-34 ปี (19.05 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.4 ลาวร้อยละ 1.6 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 42.9 รับจ้างร้อยละ 23.8 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 15.9


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (10 ราย), 15-24 ปี (9 ราย), 55-64 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 45-54 ปี (1 ราย), 9-11 เดือน (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (6 ราย), 2 ปี (3 ราย), 10-14 ปี (2 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health