
## D.H.F.

## d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 37291 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 56.36 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 47 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.46 %) 25-34 ปี (15.99 %) 10-14 ปี (15.31 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.7 พม่าร้อยละ 1.9 อื่นๆร้อยละ 1.5 กัมพูชาร้อยละ 0.4 ลาวร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ได้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 38.8 รับจ้างร้อยละ 23.5 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 19.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2919 ราย), 25-34 ปี (2142 ราย), 10-14 ปี (1688 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
  15-24 ปี (1906 ราย), 10-14 ปี (1709 ราย),
  25-34 ปี (849 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1589 ราย), 15-24 ปี (1375 ราย), 35-44 ปี (1042 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2176 ราย), 10-14 ปี (1583 ราย), 25-34 ปี (1384 ราย),



## Number of D.H.F. cases by week of onset and region.

