

## D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 219 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 13 พค 66 จาก 44 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.33 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.09 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.20 %) 25-34 ปี (20.55 %) 10-14 ปี (19.63 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.8 พม่าร้อยละ 1.4 กัมพูชาร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 50.2 รับจ้างร้อยละ 21.5 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 12.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (23 ราย), 15-24 ปี (22 ราย), 10-14 ปี (21 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (9 ราย), 10-14 ปี (5 ราย), 25-34 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 10-14 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (17 ราย), 15-24 ปี (16 ราย), 10-14 ปี (15 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

