

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 454 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 2 สค 66 จาก 63 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.69 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 25 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.03 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.43 %) 10-14 ปี (19.82 %) 25-34 ปี (16.08 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.0 พม่าร้อยละ 2.2 อื่นๆร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.7 ลาวร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 48.5 รับจ้างร้อยละ 27.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 9.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (54 ราย), 10-14 ปี (39 ราย), 25-34 ปี (38 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (23 ราย), 15-24 ปี (21 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (14 ราย), 25-34 ปี (10 ราย), 55-64 ปี (8 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (31 ราย), 10-14 ปี (22 ราย), 25-34 ปี (18 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

