

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค **D.H.F.shock syndrome** พบผู้ป่วย **184** ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 เมย 66 จาก 42 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย **0.28** ต่อแสนประชากร เสียชีวิต **6** ราย คิดเป็นอัตราตาย **0.01** ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง **1: 1.14** กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี (**21.20 %**) 15-24 ปี (**21.20 %**) 25-34 ปี (**20.11 %**) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.7 กัมพูชาร้อยละ 1.6 พม่าร้อยละ 1.1 ลาวร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 52.2 รับจ้างร้อยละ 19.6 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 11.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (22 ราย), 25-34 ปี (19 ราย), 15-24 ปี (18 ราย),
- ภาคตะวันออก/เฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 10-14 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 10-14 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (15 ราย), 10-14 ปี (12 ราย), 15-24 ปี (9 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region

2566

