

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 320 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 มิย 66 จาก 55 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.48 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 14 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.25 %) 25-34 ปี (18.75 %) 10-14 ปี (18.75 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.5 พม่าร้อยละ 0.9 กัมพูชาร้อยละ 0.9 ลาวร้อยละ 0.3 อื่นๆร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 49.7 รับจ้างร้อยละ 23.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 11.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (34 ราย), 25-34 ปี (30 ราย), 10-14 ปี (28 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (14 ราย), 10-14 ปี (9 ราย), 25-34 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (5 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (26 ราย), 25-34 ปี (21 ราย), 10-14 ปี (21 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

