## Malaria

## d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Malaria พบผู้ป่วย 4550 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 29 ตค 66 จาก 60 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.88 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.55 กลุ่มอายุที่พบ มากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.01 %) 25-34 ปี (17.08 %) 35-44 ปี (13.56 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 73.5 พม่าร้อย ละ 20.8 อื่นๆร้อยละ 5.6 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.9 รับจ้างร้อยละ 25.7 เกษตร

ร้อยละ 22.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (303 ราย), 25-34 ปี (252 ราย), 35-44 ปี (229 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
   25-34 ปี (13 ราย), 15-24 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (662 ราย), 25-34 ปี (429 ราย), 10-14 ปี (309 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (89 ราย),
   45-54 ปี (84 ราย), 25-34 ปี (83 ราย),



This plug-in isn't supported

		2566	
200 SSES 150 0 100 100 1234 5678910	112845678922238	THE	
- North	<ul><li>Central</li></ul>	<ul><li>Northeast</li></ul>	Week  — South

Number of Malaria cases by week of onset and region.

หนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อย
D 661 D G 761 18		ละ
PF : Plasmodium falciparum	74	1.6
PV : Plasmodium	2678	58.9
vivax		
PM : Plasmodium	43	0.9
malariae	10	0.0
Mixed type	6	0.1
Unknown	1749	38.4

 $<sup>\</sup>ensuremath{\texttt{©}}$  Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health