

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 353 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 10 กค 66 จาก 61 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.53 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 20 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.95 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.91 %) 10-14 ปี (19.83 %) 25-34 ปี (16.71 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.6 พม่าร้อยละ 1.7 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.6 อื่นๆร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 49.0 รับจ้างร้อยละ 25.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 11.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (42 ราย), 25-34 ปี (33 ราย), 10-14 ปี (31 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (15 ราย), 10-14 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10 ราย), 25-34 ปี (6 ราย), 35-44 ปี (5 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (28 ราย), 10-14 ปี (21 ราย), 25-34 ปี (15 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

