

รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค **D.H.F.shock syndrome** พบผู้ป่วย **114** ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 มีค 66 จาก 35 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย **0.17** ต่อแสนประชากร เสียชีวิต **5** ราย คิดเป็นอัตราตาย **0.01** ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง **1: 0.93** กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (**25.44 %**) 10-14 ปี (**21.93 %**) 25-34 ปี (**20.18 %**) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.4 ลาวร้อยละ 0.9 พม่าร้อยละ 0.9 กัมพูชาร้อยละ 0.9 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 50.9 รับจ้างร้อยละ 21.9 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 13.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (17 ราย), 15-24 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (12 ราย),
- ภาคตะวันออก/เชียงใหม่ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (5 ราย), 10-14 ปี (1 ราย), 6 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 9-11 เดือน (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (9 ราย), 10-14 ปี (6 ราย), 7-9 ปี (4 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and region
2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health