

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 412 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 กค 66 จาก 63 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.62 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 23 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.95 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (26.46 %) 10-14 ปี (19.66 %) 25-34 ปี (16.26 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.6 พม่าร้อยละ 1.9 กัมพูชาร้อยละ 0.7 ลาวร้อยละ 0.5 อื่นๆร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 48.3 รับจ้างร้อยละ 26.9 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 10.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (50 ราย), 25-34 ปี (36 ราย), 10-14 ปี (36 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (18 ราย), 15-24 ปี (17 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (12 ราย), 25-34 ปี (8 ราย), >65 ปี (5 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (30 ราย), 10-14 ปี (22 ราย), 25-34 ปี (17 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio

2566

