รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง ๕๐๖

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

D.H.F.shock syndrome


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 7 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 11 มค 66 จาก 6 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 2.50 กลุ่ม อายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (42.86 %) 10-14 ปี (28.57 %) 15-24 ปี (14.29 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 42.9 รับจ้างร้อยละ 28.6 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 28.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (3 ราย), 10-14 ปี (2 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ







© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health