

D.H.F.shock syndrome

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 898 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 9 ตค 66 จาก 72 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.36 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 70 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.11 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.05 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (24.39 %) 10-14 ปี (19.82 %) 25-34 ปี (15.59 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.5 พม่าร้อยละ 2.8 กัมพูชาร้อยละ 0.8 ลาวร้อยละ 0.4 อื่นๆร้อยละ 0.4 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 46.2 รับจ้างร้อยละ 28.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 10.4


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง อุดรดิตถ์ มุกดาหาร อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (113 ราย), 25-34 ปี (73 ราย), 10-14 ปี (71 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (59 ราย), 15-24 ปี (34 ราย), 35-44 ปี (11 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (26 ราย), 25-34 ปี (21 ราย), 55-64 ปี (19 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (46 ราย), 25-34 ปี (37 ราย), 10-14 ปี (34 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2566

